

# タクロリムス錠「日医工」 を服用される方へ

このお薬は、免疫抑制剤と呼ばれ、体内の免疫反応を抑えます。

## ▶服用する前に必ずお読みください

このお薬を服用中に**副作用があらわれることがあります**。次の症状に気づいたら、**すぐに主治医または薬剤師に連絡してください**。



この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**主治医または薬剤師に気軽に相談してください**。



関節リウマチの治療を受けている方は、病状やこのお薬の副作用などを考慮して治療継続が判断されます。気になる症状があらわれた場合は、**すぐに服用をやめて主治医または薬剤師に連絡してください**。

## ▶ 飲み方について

- 主治医または薬剤師の指示通りに服用してください。
- 飲み忘れに気付いても、決して2回分を一度に服用しないでください。



## ▶ 服用中の注意点

- このお薬の服用中は、グレープフルーツジュースやセイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)含有食品を控えてください。このお薬の効果に影響します。
- このお薬には**一緒に服用してはいけないお薬や、注意が必要なお薬があります**。他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください**。
- ワクチンの**予防接種**について主治医に相談してください。
- かぜなどの感染症にかかりやすくなることがあります。できるだけ人混みを避けてください。帰宅したら手洗いやうがい、消毒をしてください。



## ▶ 保管等に関する注意点

直射日光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。