

使用上の注意改訂のお知らせ

広範囲経口抗菌製剤

日本薬局方 レボフロキサシン錠

レボフロキサシン錠 250mg「日医工」

レボフロキサシン錠 500mg「日医工」

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社
富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21

広範囲経口抗菌製剤

日本薬局方 レボフロキサシン錠

レボフロキサシン錠 250mg「日医工 P」

レボフロキサシン錠 500mg「日医工 P」

販売元 日 医 工 株 式 会 社
富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21
製造販売元 ヤクハン製薬株式会社

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容>（ : 自主改訂）

改 訂 後			現 行		
3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）			3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
（現行どおり）			（略）		
クマリン系抗凝固薬 ワルファリン	（現行どおり）	（現行どおり）	クマリン系抗凝固薬 ワルファリン	（略）	（略）
<u>QT 延長を起こすことが知られている薬剤</u> デラマニド等	<u>QT 延長を起こすおそれがある。</u>	<u>併用により QT 延長作用が相加的に増加するおそれがある。</u>	← 記載なし		

*改訂内容につきましては DSU No.243 に掲載の予定です。

<改訂理由>

- デラマニド製剤の「使用上の注意」において、本剤を含むキノロン系抗菌薬が「QT 延長を起こすことが知られている薬剤」として「併用注意」とされていることから、整合をとるため、本剤においてもデラマニドをはじめとする「QT 延長を起こすことが知られている薬剤」を「併用注意」の項に追記いたしました。

なお、改訂後の添付文書は日医工株式会社ホームページ

http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine_m_seihin.html

及び医薬品医療機器情報提供ホームページ <http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に掲載いたします。

