

クロピドグレル錠「SANIK」 を服用される方へ

このお薬は、^{けっせん}血液のかたまり（血栓）をできにくくすることで、
血管がつまるのを防ぐ働きがあります。

先発医薬品と原薬、添加物および製法などが同一の
オーソライズド・ジェネリック医薬品*です。

（*先発医薬品メーカーの許諾を受けたジェネリック医薬品）



クロピドグレル錠25mg「SANIK」

クロピドグレル錠75mg「SANIK」

▶ 飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。血栓ができないようにするために、お薬を服用し続けることが大切です。
- 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。


▶ 服用中の注意点

- 次の場合には、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。
 - ・ 歯の治療、手術や内視鏡検査などを受ける場合（血が止まりにくくなる場合があります）
 - ・ 他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合（一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります）



▶ 副作用について

- 次の症状に気づいたら、**すぐに医師または薬剤師に連絡してください。**



この他にも気になる症状があらわれた場合や、わからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

▶ 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。

クロピドグレル錠「SANIK」 を服用される方へ

このお薬は、^{けっせん}血液のかたまり（血栓）をできにくくすることで、
血管がつまるのを防ぐ働きがあります。

先発医薬品と原薬、添加物および製法などが同一の
オーソライズド・ジェネリック医薬品*です。

（*先発医薬品メーカーの許諾を受けたジェネリック医薬品）



クロピドグレル錠25mg「SANIK」

クロピドグレル錠75mg「SANIK」

▶ 飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。血栓ができないようにするために、お薬を服用し続けることが大切です。
- 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。


▶ 服用中の注意点

- 次の場合には、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。
 - ・ 歯の治療、手術や内視鏡検査などを受ける場合（血が止まりにくくなる場合があります）
 - ・ 他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合（一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります）



▶ 副作用について

- 次の症状に気づいたら、**すぐに医師または薬剤師に連絡してください。**



この他にも気になる症状があらわれた場合や、わからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

▶ 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。