

使用上の注意改訂のお知らせ

経口用セフェム系抗生物質製剤

日本薬局方 セフトレン ピボキシル錠

セフトレンピボキシル錠 100mg「日医工」

販売元 日医工株式会社
富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21
製造販売元 日医工ファーマ株式会社

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容> (..... : 自主改訂)

改 訂 後	現 行
<p>3. 副作用 (1) 重大な副作用（頻度不明） 1)～2)： 略 3) 中毒性表皮壊死融解症（<u>Toxic Epidermal Necrolysis：TEN</u>）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群） 中毒性表皮壊死融解症（<u>Toxic Epidermal Necrolysis：TEN</u>）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。 4)～7)： 略 (2)： 略</p>	<p>3. 副作用 (1) 重大な副作用（頻度不明） 1)～2)： 略 3) 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、中毒性表皮壊死症（Lyell 症候群） 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、中毒性表皮壊死症（Lyell 症候群）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。 4)～7)： 略 (2)： 略</p>

* 改訂内容につきましては DSU No.269 に掲載の予定です。

<改訂理由>

- 「副作用」の項に記載して参りました「中毒性表皮壊死症（Lyell 症候群）」が近年「中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）」と表記されていることから、記載整備を行いました。

なお、改訂後の添付文書は日医工株式会社ホームページ <https://www.nichiiko.co.jp/medicine/search> 及び医薬品医療機器総合機構ホームページ <http://www.pmda.go.jp/> に掲載いたします。

