

セフジトレンピボキシル 細粒小児用「日医工」

を服用されるお子様のご家族の方へ


- ◆以前にお薬を飲んでアレルギー症状をおこしたことがある場合や、ご家族にアレルギー症状をおこしやすい体質の方がいる場合は、お薬を飲む前に医師または薬剤師にご相談ください。
- ◆このお薬を飲んで、お子様の意識がもうろうとしたり、けいれんを起したり、ぐったりしている等の重篤な低血糖症状が現れた場合には、早急に医療機関を受診するようにしてください。



このお薬は、感染症の治療に用いる

オレンジ風味の甘いお薬です。

そのまま水で飲ませるか、
少量の水に混ぜて飲ませてください。



服用における注意

- 作り置きせず、飲ませる直前に混ぜてください。時間が経つと苦くなります。
- 開封後は、速やかに飲ませてください。

裏面もお読みください →

お薬を上手に飲ませるための工夫

水の代わりに、次のものと混ぜると飲ませやすくなります。
子供が飲みきれるように、混ぜる量は少量にしてください。



ミルクには混ぜて飲ませないでください。

小さなお子様には・・・

お薬にごく少量の水やぬるま湯を加え、ペースト状に練ります。きれいに洗った指先にお薬をつけ、お子様の上顎に塗りつけてください。

スプーンに慣れているお子様には、練ったお薬をスプーンにのせ、そのまま飲ませてあげてください。その後、水などを十分に飲ませ、口の中にお薬が残らないようにしてあげてください。

上手に飲めたら褒めてあげましょう。🌸



保管における注意

- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光、高温多湿を避けて保管してください。

お薬を飲ませて下痢や皮疹などの症状が現れた場合は、
医師または薬剤師にご相談ください。

セフジトレンピボキシル 細粒小児用「日医工」

を服用されるお子様のご家族の方へ


- ◆以前にお薬を飲んでアレルギー症状をおこしたことがある場合や、ご家族にアレルギー症状をおこしやすい体質の方がいる場合は、お薬を飲む前に医師または薬剤師にご相談ください。
- ◆このお薬を飲んで、お子様の意識がもうろうとしたり、けいれんを起したり、ぐったりしている等の重篤な低血糖症状が現れた場合には、早急に医療機関を受診するようにしてください。



このお薬は、感染症の治療に用いる

オレンジ風味の甘いお薬です。

そのまま水で飲ませるか、
少量の水に混ぜて飲ませてください。



服用における注意

- 作り置きせず、飲ませる直前に混ぜてください。時間が経つと苦くなります。
- 開封後は、速やかに飲ませてください。

裏面もお読みください

お薬を上手に飲ませるための工夫

水の代わりに、次のものと混ぜると飲ませやすくなります。
子供が飲みきれるように、混ぜる量は少量にしてください。



ミルクには混ぜて飲ませないでください。

小さなお子様には・・・

お薬にごく少量の水やぬるま湯を加え、ペースト状に練ります。きれいに洗った指先にお薬をつけ、お子様の上顎に塗りつけてください。

スプーンに慣れているお子様には、練ったお薬をスプーンにのせ、そのまま飲ませてあげてください。その後、水などを十分に飲ませ、口の中にお薬が残らないようにしてあげてください。

上手に飲めたら褒めてあげましょう。



保管における注意

- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光、高温多湿を避けて保管してください。

お薬を飲ませて下痢や皮疹などの症状が現れた場合は、
医師または薬剤師にご相談ください。