

## 使用上の注意改訂のお知らせ

セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤(SNRI)

ミルナシプラン塩酸塩錠 12.5mg「日医工」

ミルナシプラン塩酸塩錠 15mg「日医工」

ミルナシプラン塩酸塩錠 25mg「日医工」

ミルナシプラン塩酸塩錠 50mg「日医工」

ミルナシプラン塩酸塩錠

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社  
富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

### <改訂内容> (-----:自主改訂)

| 改 訂 後   |  |  | 現 行   |           |         |
|---|--|--|---|-----------|---------|
| 3. 相互作用<br>(2) 併用注意（併用に注意すること）                        |  |  | 3. 相互作用<br>(2) 併用注意（併用に注意すること）                        |           |         |
| 薬剤名等  | 臨床症状・措置方法                              | 機序・危険因子  | 薬剤名等  | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| (現行どおり)   |  |  | (略)   |           |         |
| 5-HT <sub>1B/1D</sub> 受容体<br>作動薬<br>スマトリプタン<br>コハク酸塩等 | (現行どおり)                                | (現行どおり)  | 5-HT <sub>1B/1D</sub> 受容体<br>作動薬<br>スマトリプタン<br>コハク酸塩等 | (略)       | (略)     |
| メチルチオニウム<br>塩化物水和物（メチ<br>レンブルー）                       | <u>セロトニン症候群が<br/>あらわれるおそれ<br/>がある。</u> | <u>左記薬剤の MAO 阻害<br/>作用によりセロトニ<br/>ン作用が増強される。</u> | ジゴキシン   | (略)       | (略)     |
| ジゴキシン   | (現行どおり)                                | (現行どおり)  | (略)   |           |         |
| (現行どおり)   |  |  |   |           |         |

\* 改訂内容につきましては DSU No.245 に掲載の予定です。

### <改訂理由>

- メチルチオニウム塩化物水和物製剤（メチレンブルー）の「使用上の注意」の「相互作用」の項において、本剤が「併用注意」とされていることから、整合をとるため、本剤においてもメチルチオニウム塩化物水和物を「相互作用」の「併用注意」の項に追記いたしました。

なお、改訂後の添付文書は日医工ホームページ

[http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine\\_m\\_seihin.html](http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine_m_seihin.html)

及び医薬品医療機器情報提供ホームページ <http://www.info.pmda.go.jp/> に掲載致します。

