

ミルナシبران塩酸塩錠 12.5mg「日医工」
ミルナシبران塩酸塩錠 15mg「日医工」
ミルナシبران塩酸塩錠 25mg「日医工」
ミルナシبران塩酸塩錠 50mg「日医工」
適正使用のお願い

製造販売元 日医工株式会社

本剤を処方中の患者さんが**自動車運転を希望**された場合には以下の点にご注意ください

- 患者さんの**うつ病等の精神疾患の状態が安定しているかをよく観察**してください。
- 本剤の投与により、めまい、眠気に代表される**自動車運転に影響を与える可能性のある副作用**が発生することがあります。そのため、**患者さんに自覚症状の有無を確認**してください。
- **本剤の投与初期、他剤から本剤への切り替え、本剤の用量変更時**については、患者さんにとって適切な用量で精神疾患の状態が安定しているか、特に患者さんの状態について注意する必要があります。そのため、**自動車運転の可否をご判断いただく前に一定の間は、患者さんの状態を観察**することを検討してください。
- 患者さんの状態には**個人差**があります。そのため、**個々の患者さんをよく観察**をお願いいたします。
- 多剤併用処方**は避け、必要最小限のシンプルな処方計画**を心掛けてください。また、患者さんが**他の薬剤を併用する場合には運転の影響を予測することが困難**なため、**場合によっては運転を避けるよう指導**することが適切な場合もあります。
- **薬剤を増量した場合や過量投与となった場合に副作用の発現リスクが高まる**ため、本剤の**用法・用量を厳守**してください。

運転を希望する患者さんのうち、運転可能と判断された患者さんに対しては、本剤の処方にあたっては以下の点をご指導ください


- 本剤の投与により、めまい、眠気に代表される**自動車運転に影響を与える可能性のある副作用が発生**することがあること。
- 本剤の投与初期、他剤から本剤への切り替え、本剤の用量変更時等は、自動車運転に影響を与える可能性のある副作用が発生しやすいため、医師に一定期間運転を控えるよう指導された場合には、運転を控えること。また、めまい、眠気や睡眠不足等の**体調不良を自覚した場合には、絶対に自動車運転を行わない**こと。

ミルナシبران塩酸塩製剤の患者さん向け説明資料について

本剤服用時の注意事項を記載した患者さん向け指導箋をご用意しておりますので、患者さんへのご説明の際にご活用いただきますようお願い申し上げます。



A5 版 本剤服用時の注意事項全般



A6 版 自動車運転等に関する注意事項

資料につきましては、弊社担当MR又はお客様サポートセンターまでお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先 日医工株式会社
 お客様サポートセンター
 TEL: 0120-517-215