

モンテルカストチュアブル錠 5mg「日医工」

を服用されるお子様の 保護者の方へ



このお薬は気道の炎症や収縮を抑えて、
気管支喘息の症状を改善するお薬です。

飲み方について

- 主治医の指示通りに服用してください。自己判断で服用を中止したり、量を加減したりしないでください。
- 1日1回寝る前に服用してください。
- 飲み忘れた場合は、次の日に1回分を服用してください。決して2回分を一度に飲まないでください。
- このお薬はチュアブル錠です。口の中で溶かすか、かみ砕いて服用してください。水なしでも服用できます。

服用中の注意点

- ぜんそくが良好にコントロールされている場合でも継続して飲んでください。
- すでに起こっているぜんそく発作を改善するお薬ではありません。

副作用について

- このお薬を服用中に気になる症状があらわれたら、主治医または薬剤師にご相談ください。



保管に関する注意点

- 光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。



モンテルカストチュアブル錠 5mg「日医工」

を服用されるお子様の 保護者の方へ



このお薬は気道の炎症や収縮を抑えて、
気管支喘息の症状を改善するお薬です。

飲み方について

- 主治医の指示通りに服用してください。自己判断で服用を中止したり、量を加減したりしないでください。
- 1日1回寝る前に服用してください。
- 飲み忘れた場合は、次の日に1回分を服用してください。決して2回分を一度に飲まないでください。
- このお薬はチュアブル錠です。口の中で溶かすか、かみ砕いて服用してください。水なしでも服用できます。

服用中の注意点

- ぜんそくが良好にコントロールされている場合でも継続して飲んでください。
- すでに起こっているぜんそく発作を改善するお薬ではありません。

副作用について

- このお薬を服用中に気になる症状があらわれたら、主治医または薬剤師にご相談ください。



保管に関する注意点

- 光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。

