

セレコキシブ錠「日医工」 を服用される方へ

このお薬はCOX(シクロオキシゲナーゼ)-2選択的阻害剤
と呼ばれる痛みや腫れを抑えるお薬です。



服用前の注意点

- 次の方は、服用する前に必ず医師または薬剤師に相談してください。
 - 以前にお薬を服用して、発疹や喘息症状がでたことのある方
 - 胃潰瘍や十二指腸潰瘍のある方、または過去になったことのある方
 - 心臓・肝臓・腎臓に病気のある方、または過去になったことのある方
 - 気管支喘息の方
 - 高血圧症の方
 - 妊娠または妊娠している可能性のある方、授乳中の方
 - 他のお薬を服用されている方

服用上の注意点

- 必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。自己判断で服用を中止したり、お薬の量を増やしたり減らしたりしないでください。
- 飲み忘れに気づいた時は、1回分を服用してください。ただし、次に服用する時間が近い場合には、1回とばして次の決められた時間に1回分を服用してください。決して一度に2回分を服用しないでください。

服用中の注意点

- このお薬の服用中にめまいやぼんやりする(傾眠)などがあらわれることがありますので、自動車の運転など危険を伴う作業をする時は十分注意してください。
- 服用開始から2~4週間たってもあまり効果がないときには医師または薬剤師に相談してください。
- このお薬と一緒に服用してはいけないお薬や、注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用の注意点

以下のような症状があらわれた場合は、ただちに医師または薬剤師に相談してください。



これら以外にも吐き気、腹痛、発熱、皮膚が黄色くなる、尿量が減るなどの症状があらわれることがあります。気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管等に関する注意点

- 直射日光と高温多湿を避けて保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人(親、兄弟、姉妹、友人など)に絶対に渡さないでください。

セレコキシブ錠「日医工」 を服用される方へ

このお薬はCOX(シクロオキシゲナーゼ)-2選択的阻害剤
と呼ばれる痛みや腫れを抑えるお薬です。



服用前の注意点

- 次の方は、服用する前に必ず医師または薬剤師に相談してください。
 - 以前にお薬を服用して、発疹や喘息症状がでたことのある方
 - 胃潰瘍や十二指腸潰瘍のある方、または過去になったことのある方
 - 心臓・肝臓・腎臓に病気のある方、または過去になったことのある方
 - 気管支喘息の方
 - 高血圧症の方
 - 妊娠または妊娠している可能性のある方、授乳中の方
 - 他のお薬を服用されている方

服用上の注意点

- 必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。自己判断で服用を中止したり、お薬の量を増やしたり減らしたりしないでください。
- 飲み忘れに気づいた時は、1回分を服用してください。ただし、次に服用する時間が近い場合には、1回とばして次の決められた時間に1回分を服用してください。決して一度に2回分を服用しないでください。

服用中の注意点

- このお薬の服用中にめまいやぼんやりする(傾眠)などがあらわれることがありますので、自動車の運転など危険を伴う作業をする時は十分注意してください。
- 服用開始から2~4週間たってもあまり効果がないときには医師または薬剤師に相談してください。
- このお薬と一緒に服用してはいけないお薬や、注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用の注意点

以下のような症状があらわれた場合は、ただちに医師または薬剤師に相談してください。



これら以外にも吐き気、腹痛、発熱、皮膚が黄色くなる、尿量が減るなどの症状があらわれることがあります。気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管等に関する注意点

- 直射日光と高温多湿を避けて保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人(親、兄弟、姉妹、友人など)に絶対に渡さないでください。