

使用上の注意改訂のお知らせ

経皮鎮痛消炎剤

ケトプロフェンテープ 20mg「日医工」

ケトプロフェンテープ 40mg「日医工」

ケトプロフェン含有プラスター剤

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社

富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容> (..... : 自主改訂)

改 訂 後		現 行	
4. 副作用 (2) その他の副作用		4. 副作用 (2) その他の副作用	
	頻度不明 (現行どおり)		頻度不明 (略)
過 敏 症 ^{注)}	(現行どおり)	過 敏 症 ^{注)}	(略)
消 化 器	<u>消化性潰瘍</u>		
注：このような症状があらわれた場合は直ちに使用を中止すること。		← 記載なし 注：このような症状があらわれた場合は直ちに使用を中止すること。	

* 改訂内容につきましては DSU No.269 に掲載の予定です。

<改訂理由>

- ケトプロフェンテープ製剤との因果関係が否定できない副作用発現症例が報告されていることから、「副作用」の「その他の副作用」の項の分類に「消化器」を追加し、「消化性潰瘍」を追記いたしました。

なお、改訂後の添付文書は日医工株式会社ホームページ <https://www.nichiiko.co.jp/medicine/search>
及び医薬品医療機器総合機構ホームページ <http://www.pmda.go.jp/> に掲載いたします。

