

ケトプロフェンテープ20mg/40mg「日医工」 を使用される方へ

このお薬は炎症を抑えて痛みを和らげる貼り薬です。
医師または薬剤師の指示どおりにお使いください。


使用する前に必ずお読みください

このお薬を貼っていると日光を当てないでください。日光が当たること、発疹や水ぶくれ、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれることがあります。
これらの症状があらわれたら、直ちに使用を中止し、症状が出た部位に日光を当てないようにして医師または薬剤師に相談してください。

日常生活における注意点

例) 肘に貼った場合

- ① 戸外での活動を控える
- ② 貼付部に日光を当てない
- ③ 外出時は濃い色の服や長袖・長ズボン、サポーターを着用し、貼付部を遮光する
- ④ はがした後、少なくとも4週間は同様に注意する



副作用について

- 次の症状に気づいたら、**直ちに使用を中止し医師または薬剤師に相談してください。**



蕁麻疹



眼や口唇まわりの腫れ



息切れ



息苦しい

その他の注意点


- 妊娠後期の女性は使用しないでください。
- 傷や湿疹または発疹のある部位、眼の周りには貼らないでください。
- このお薬を他の人に譲らないようにしてください。
(譲られた方が使用し、かぶれたりすることがあります。)

裏面もお読みください



このお薬の貼り方

1




透明フィルムを上にして
折り曲げます。

2



中央部のフィルムだけを
はがします。

3




両側のフィルムはそのまま
で中央部だけを患部に
貼ります。

4



片方のフィルムをはがし
患部にのばしながら貼り、
最後にもう片方のフィルム
をはがし患部に貼ります。

このお薬のはがし方



カドからゆっくりと肌に添わせる
ように対角線方向に巻きながら
はがします。

保管等に関する注意点

- 開封後はチャックをしめて保管してください。
- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- お薬が余った場合は、医師または薬剤師に相談してください。

他の病院を受診する場合等の注意点

- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**このお薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**



日医工株式会社

2026年6月作成 N202600100

薬袋の裏の「ご使用になる前に必ずお読みください」をよくお読みの上、正しくお使いください。


▶ このお薬の貼り方

1




透明フィルムを上にして
折り曲げます。

2




中央部のフィルムだけを
はがします。

3




両側のフィルムはそのまま
で中央部だけを患部に
貼ります。

4



片方のフィルムをはがし
患部にのばしながら貼り、
最後にもう片方のフィルム
をはがし患部に貼ります。

▶ このお薬のはがし方



カドからゆっくりと肌に添わせる
ように対角線方向に巻きながら
はがします。

▶ 保管等に関する注意点

- 開封後はチャックをしめて保管してください。
- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- お薬が余った場合は、医師または薬剤師に相談してください。

▶ 他の病院を受診する場合等の注意点

- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**このお薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**



日医工株式会社

2026年6月作成 N202600100

薬袋の裏の「ご使用になる前に必ずお読みください」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ケトプロフェンテープ20mg／40mg「日医工」 を使用される方へ

このお薬は炎症を抑えて痛みを和らげる貼り薬です。
医師または薬剤師の指示どおりにお使いください。

使用する前に必ずお読みください

このお薬を貼っているところに日光を当てないでください。日光が当たること、発疹や水ぶくれ、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれることがあります。

これらの症状があらわれたら、直ちに使用を中止し、
症状が出た部位に日光を当てないようにして医師
または薬剤師に相談してください。


日常生活における注意点

(例) 肘に貼った場合

- ① 戸外での活動を控える
- ② 貼付部に日光を当てない

- ③ 外出時は濃い色の服や長袖・長ズボン、サポーターを着用し、貼付部を遮光する

- ④ はがした後、少なくとも4週間は同様に注意する



▶ 副作用について

- 次の症状に気づいたら、**直ちに使用を中止し医師または薬剤師に相談してください。**



蕁麻疹



眼や口唇まわりの腫れ



息切れ



息苦しい

▶ その他の注意点

- 妊娠後期の女性は使用しないでください。
- 傷や湿疹または発疹のある部位、眼の周りには貼らないでください。
- このお薬を他の人に譲らないようにしてください。(譲られた方が使用し、かぶれたりすることがあります。)

裏面もお読みください