

ケトプロフェンテープ 20mg／40mg「日医工」 を使用される方へ

このお薬は**炎症を抑えて痛みを和らげる貼り薬**です。
医師または薬剤師の指示どおりにお使いください。

使用する前に必ずお読みください

このお薬を貼っているところに日光を当てないでください。
日光が当たることで、発疹や水ぶくれ、かゆみ、かぶれ等の
症状があらわれることがあります。


これらの症状があらわれたら、直ちに使用を中止し、症状が
出た部位に日光を当てないようにして医師または薬剤師に
相談してください。

日常生活における注意点

- ① 戸外での活動を控える
- ② 貼付部に日光を当てない
- ③ 外出時は濃い色の服や長袖・長ズボン、サポーターを着用し、貼付部を遮光する
- ④ はがした後、少なくとも4週間は同様に注意する

例) 肘に貼った場合

はがした後もくすりは
皮膚に残っています。




▶ 貼る時の注意点

- 傷や湿疹または発疹のある部位、眼の周りには貼らないでください。

▶ このお薬の貼り方とはがし方


貼り方

1




透明フィルムを上にして折り曲げます。

2




中央部のフィルムだけをはがします。

3



両側のフィルムはそのまま中央部だけを患部に貼ります。


4



片方のフィルムをはがし患部にのぼしながら貼り、最後にもう片方のフィルムをはがし患部に貼ります。

貼り忘れた場合は、気づいた時点で貼ってください。

はがし方



カドからゆっくりと肌に添わせるように対角線方向に巻きながらはがします。

▶ 他の病院を受診する場合等の注意点

- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**このお薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**



▶ 副作用について

- 次の症状に気づいたら、**直ちに使用を中止し医師または薬剤師に相談してください。**



蕁麻疹



眼や口唇まわりの腫れ



息切れ



息苦しい

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

▶ 保管等に関する注意点

- 開封後はチャックをしめて保管してください。
- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。
- お薬が余った場合は、医師または薬剤師に相談してください。