

使用上の注意改訂のお知らせ

アレルギー性疾患治療剤

オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「日医工」

オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「日医工」

オロパタジン塩酸塩錠

オロパタジン塩酸塩 OD 錠 2.5mg 「日医工」

オロパタジン塩酸塩 OD 錠 5mg 「日医工」

オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社  
富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容> ( \_\_\_\_\_ : 自主改訂)

改 訂 後		現 行	
3. 副作用 (2) その他の副作用		3. 副作用 (2) その他の副作用	
	頻度不明 (現行どおり)		頻度不明 (略)
血 液	白血球増多・減少, 好酸球増多, リンパ球減少, <u>血小板減少</u>	血 液	白血球増多・減少, 好酸球増多, リンパ球減少
	(現行どおり)		(略)

\*改訂内容につきましては DSU No.222 に掲載の予定です。

<改訂理由>

- ・オロパタジン塩酸塩製剤と関連性が否定できない副作用症例が集積されたことから、「副作用」の「その他の副作用」の項に「血小板減少」を追記いたしました。

なお、改訂後の添付文書は日医工ホームページ

[http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine\\_m\\_seihin.html](http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine_m_seihin.html)

及び医薬品医療機器情報提供ホームページ <http://www.info.pmda.go.jp/> に掲載いたします。

