



# 新発売のご案内

## リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」

この度、弊社販売の『リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」』につきまして、新たに骨ペーজেット病用 PTP56錠の包装規格を発売いたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

従来の包装規格と同様、ご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

2019年1月

記

### 1 発売日

■発売日：2019年1月21日（月）

### 2 対象製品

リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」

追加包装規格：骨ペーজেット病用包装 PTP56錠（7錠×8）

### 3 製品情報

#### ■仕様



〈患者様用指導箋〉

■患者様用指導箋を個装箱に封入します。(3枚)

【表】

## リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」

を服用される骨ページェット病の方へ

このお薬は毎日1回1錠を8週間服用する骨ページェット病のお薬です。

**1 毎日1回8週間**  
服用します。

**2 朝起きたとき(食事の前に)1錠**

空腹時のほうがお薬の効果が発揮されやすくなります。

**3 コップ1杯の水(またはぬるま湯)**

(約180mL)で、かまずに飲みましょう

- お茶がのどや食道に引っかかると炎症を起こす可能性がありますので、十分な水で服用します。
- 水以外の飲み物(酸度の高いミネラルウォーターや、牛乳・お茶・コーヒー・ジュースなど)や食べ物、他のお薬と一緒に飲むと、お薬の吸収が悪くなる場合があります。
- お薬をかんだり、口の中で溶かしたりすると、口やのどを刺激することがあります。

**4 お薬を飲んだあと30分間は**

- 横にならない
- 水以外の飲食はしない
- 他のお薬も飲まない
- 横になると、お薬が逆流し、食道を刺激することがあります。
- 胃の中に水以外のものがあると、お薬の吸収が悪くなる場合があります。

【裏】

### 飲み忘れたら

- 気がついた日の翌朝に1錠飲んでください。
- 同じ日に2錠飲まないでください。



### お薬についての注意

このお薬を飲んで次の症状が現れた場合は、すぐに医師、または薬剤師に相談してください。

- 飲み込みにくい ●飲み込むときに痛い ●胸やけ ●腰痛
- からだがだるい ●太ももや太ももの付け根の痛み など

このお薬を飲んで次の症状が現れた場合は、すぐに医師、歯科医師、薬剤師に相談してください。

- おこの痛み ●歯のゆるみ ●歯ぐきの腫れ など

歯科治療を受ける場合は、必ずこのお薬を服用していることを歯科医師に伝えてください。

このお薬を飲んで以下の症状が続く場合は、耳鼻咽喉科の医師、または薬剤師に相談してください。

- 耳のかゆみ ●耳の違和感 ●耳だれ
- 耳の痛み など

他にも何か気になることがあれば、医師または薬剤師に相談してください。

### お薬の保管等

- 直射日光・高温多湿を避けて室温で保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬は、あなただけに処方されたお薬です。
- 他の人(親、兄弟、姉妹、友人など)に絶対に渡さないでください。

ご不明な点がありましたら医師、薬剤師にお尋ねください。

日医工株式会社

NG01800303

## ■基本情報

- 薬効分類：骨粗鬆症治療剤／骨ページェット病治療剤
- 貯 法：室温保存
- 規制区分：劇薬、処方箋医薬品
- 使用期限：3年

## ■薬価、各種コード

製品名	リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」
規格	骨ページェット病用包装 PTP56錠(7錠×8)
薬価	215.10円/錠
包装薬価	12,045.60円
統一商品コード	376-18233-1
調剤包装単位コード	04987376182355
販売包装単位コード	14987376182338
薬価基準収載医薬品コード(YJコード)	3999019F2170
レセプトコード(個別)	622229301
HOT13	1222937010201

## ■サイズ・重量・入数

製品名	包装規格	個装箱		元梱包		
		サイズ(mm)	重量(g)	サイズ(mm)	重量(g)	入数
リセドロン酸Na錠 17.5mg「日医工」	PTP56錠 (7錠×8)	139×56×42	84	435×295×310	8,270	90

以上