

きょうはく せいしょうがい しょう に かん じゃ

強迫性障害の小児患者さんへ

フルボキサミンマレイン酸塩錠「日医工」

ただ ふく よう
を正しく服用していただくために

① お医者さんの言うとおりに飲んでください。

② ほかの病院などでもらっているお薬や、健康食品・サプリメントを飲んでいる場合は、おうちの人に相談してください。

③ このお薬は口の中なかでかみくだと苦味があり、舌がしびれることがあります。お薬を飲むときは、お水みずでかまずに飲んでください。



④ このお薬を飲んだときは、ねむくなることあるため、危険を伴うような行動は避けましょう。



5 このお薬は、^{くすり}の^{はじ}こ^{ころ}に、^{わる}きもちが悪く

なることがあります。この^{わる}きもちが^{しょうじょう}悪い症状は

の^{つづ}飲み^{かる}続けるとだんだん軽くなります。きもちが

^{わる}悪いことが^{かん}つらいと感じたり、いつまでも^{つづ}続い

たりするときは、^{じぶん}自分の^{かんが}考えで^{くすり}お薬をやめずに、

^{ひと}うちの^{そうだん}人に相談してください。



6 ^{きょうはく}強^{せいしやうがい}迫性障^{びやうき}害の病気がよくなっても、

^{じぶん}自分の^{かんが}考えで、^{くすり}お薬を^の飲むことをやめたり、

の^{りやう}量を^へ減らしたりしないでください。^{あたま}頭が

^{いた}痛くなったり、^{わる}きもちが悪くなったり、^{ふらふら}ふらふら

するなどの^{しょうじょう}症状がでることがあります。



7 ^{さんえんじやう}フルボキサミン^{にちいこう}マレイン酸塩錠「日医工」だけではなく、このお薬と同じ

^{くすり}ようなお薬を^{ふくよう}服用すると^{いか}以下のような^{しょうじょう}症状がでることがあります。

これらの^{しょうじょう}症状が^{ばあい}でた場合は、^{ひと}すぐにおうちの^いの人に^い言ってください。

・^{とく}特に^{くすり}お薬を^の飲み^{はじ}始めたときや^{くすり}お薬の^{りやう}量を

^{かえ}変えたときに、^{ふあん}不安な^{つよ}きもちが強くなり、

^し死にたいと思うなどの^{おち}症状^{しょうじょう}がでることが

あります。



ご家族の方へ

- **お子さまが他の病院から処方されたお薬や健康食品・サプリメントを服用している場合は、医師にご相談ください。**また、お子さまから、フルボキサミンマレイン酸塩錠「日医工」を服用することによる副作用について、相談されましたら、自己判断せず、医師または薬剤師にご相談ください。
- フルボキサミンマレイン酸塩錠「日医工」に限らず、選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）を服用すると以下のような症状があらわれることがあります。これらの**症状があらわれた場合は、すぐに医師に連絡してください。**
 - 特に、お薬を飲み始めたときやお薬の量を変更したときに、不安な気持ちが強くなり、死にたいと思うなどの症状がでることがあります。
 - 不安、イライラ感、あせり、興奮、発作的なパニック状態、神経過敏が生じたり、自分や他人を傷つきたいと思う気持ちが強くなったりすることがあります。
- **ご家族の方は、お子さまの「死にたいという気持ちになる」、「興奮しやすい」、「攻撃的になる」、「ちょっとした刺激で気持ちの変調をきたす」など、「行動の変化」または「もともとある病気の症状が悪化する危険性」について主治医から十分に理解できるまで説明を受けてください。お子さまの状態の変化について観察し、変化がみられた場合には、すぐに医師に連絡してください。**

