

ご家族の方へ

- お子さまが他の病院から処方されたお薬や健康食品・サプリメントを服用している場合は、医師にご相談ください。また、お子さまから、フルボキサミンマレイン酸塩錠「日医工」を服用することによる副作用について、相談されましたら、自己判断せず、医師または薬剤師にご相談ください。
- フルボキサミンマレイン酸塩錠「日医工」に限らず、選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）を服用すると以下のような症状があらわれることがあります。これらの**症状があらわれた場合は、すぐに医師に連絡してください。**
 - 特に、お薬を飲み始めたときやお薬の量を変更したときに、不安な気持ちが強くなり、死にたいと思うなどの症状がでることがあります。
 - 不安、イライラ感、あせり、興奮、発作的なパニック状態、神経過敏が生じたり、自分や他人を傷つけたいと思う気持ちが強くなったりすることがあります。
- ご家族の方は、お子さまの「死にたいという気持ちになる」、「興奮しやすい」、「攻撃的になる」、「ちょっとした刺激で気持ちの変調をきたす」など、「行動の変化」または「もともとある病気の症状が悪化する危険性」について主治医から十分に理解できるまで説明を受けてください。**お子さまの状態の変化について観察し、変化がみられた場合には、すぐに医師に連絡してください。**



日医工 株式会社

2024年6月作成 N202400123

きょうはくせいしょうがいしょうにかんじゃ

強迫性障害の小児患者さんへ

フルボキサミンマレイン酸塩錠「日医工」

ただふくようを正しく服用していただくために

- 1 お医者さんの言うとおりに飲んでください。
- 2 ほかの病院などでもらっているお薬や、健康食品・サプリメントを飲んでいる場合は、おうちの人に相談してください。
- 3 このお薬は口の中なかでかみくだと苦味があり、舌がしびれることがあります。お薬を飲むときは、おおみず多めの水でかまずに飲んでください。
- 4 このお薬を飲んだときは、ねむくなることがあるため、危険を伴うような行動は避けましょう。



ご家族の方へ

- お子さまが他の病院から処方されたお薬や健康食品・サプリメントを服用している場合は、医師にご相談ください。また、お子さまから、フルボキサミンマレイン酸塩錠「日医工」を服用することによる副作用について、相談されましたら、自己判断せず、医師または薬剤師にご相談ください。
- フルボキサミンマレイン酸塩錠「日医工」に限らず、選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）を服用すると以下のような症状があらわれることがあります。これらの**症状があらわれた場合は、すぐに医師に連絡してください。**
 - 特に、お薬を飲み始めたときやお薬の量を変更したときに、不安な気持ちが強くなり、死にたいと思うなどの症状がでることがあります。
 - 不安、イライラ感、あせり、興奮、発作的なパニック状態、神経過敏が生じたり、自分や他人を傷つけたいと思う気持ちが強くなったりすることがあります。
- ご家族の方は、お子さまの「死にたいという気持ちになる」、「興奮しやすい」、「攻撃的になる」、「ちょっとした刺激で気持ちの変調をきたす」など、「行動の変化」または「もともとある病気の症状が悪化する危険性」について主治医から十分に理解できるまで説明を受けてください。**お子さまの状態の変化について観察し、変化がみられた場合には、すぐに医師に連絡してください。**



日医工 株式会社

2024年6月作成 N202400123

きょうはくせいしょうがいしょうにかんじゃ

強迫性障害の小児患者さんへ

フルボキサミンマレイン酸塩錠「日医工」

ただふくようを正しく服用していただくために

- 1 お医者さんの言うとおりに飲んでください。
- 2 ほかの病院などでもらっているお薬や、健康食品・サプリメントを飲んでいる場合は、おうちの人に相談してください。
- 3 このお薬は口の中なかでかみくだと苦味があり、舌がしびれることがあります。お薬を飲むときは、おおみず多めの水でかまずに飲んでください。
- 4 このお薬を飲んだときは、ねむくなることがあるため、危険を伴うような行動は避けましょう。



5 このお薬は、飲み始めた頃に、きもちが悪くなる
ことがあります。このきもちが悪い症状は
飲み続けるとだんだん軽くなります。きもちが
悪いことがつらいと感じたり、いつまでも続い
たりするときは、自分の考えでお薬をやめず、
おうちの人に相談してください。



6 強迫性障害の病気がよくなっても、
自分の考えで、お薬を飲むことをやめたり、
飲む量を減らしたりしないでください。頭が
痛くなったり、きもちが悪くなったり、ふらふら
するなどの症状がでることがあります。



7 フルボキサミンマレイン酸塩錠「日医工」だけではなく、このお薬と同じ
ようなお薬を服用すると以下のような症状がでることがあります。
これらの症状がでた場合は、すぐにおうちの人に言ってください。

・特にお薬を飲み始めたときやお薬の量を
変えたときに、不安なきもちが強くなり、
死にたいと思うなどの症状がでることが
あります。




・不安（どきどきする）、イライラ感、あせり、
興奮、発作的なパニック状態、神経過敏
（小さいことがとても気になるなど）の症状が
でたり、自分や他の人を傷つけたいと思う
きもちが強くなったりすることがあります。



8 このお薬は、あなただけのお薬ですので、
他の人にあげたりしないでください。



9 心配なことやわからないことがある場合は、お医者さんや病院の人に
聞いてください。このお薬を飲んで、いつもとちがうことがあったら、
おうちの人にすぐに言ってください。



5 このお薬は、飲み始めた頃に、きもちが悪く
なることがあります。このきもちが悪い症状は
飲み続けるとだんだん軽くなります。きもちが
悪いことがつらいと感じたり、いつまでも続い
たりするときは、自分の考えでお薬をやめず、
おうちの人に相談してください。



6 強迫性障害の病気がよくなっても、
自分の考えで、お薬を飲むことをやめたり、
飲む量を減らしたりしないでください。頭が
痛くなったり、きもちが悪くなったり、ふらふら
するなどの症状がでることがあります。



7 フルボキサミンマレイン酸塩錠「日医工」だけではなく、このお薬と同じ
ようなお薬を服用すると以下のような症状がでることがあります。
これらの症状がでた場合は、すぐにおうちの人に言ってください。

・特にお薬を飲み始めたときやお薬の量を
変えたときに、不安なきもちが強くなり、
死にたいと思うなどの症状がでることが
あります。



・不安（どきどきする）、イライラ感、あせり、
興奮、発作的なパニック状態、神経過敏
（小さいことがとても気になるなど）の症状が
でたり、自分や他の人を傷つけたいと思う
きもちが強くなったりすることがあります。



8 このお薬は、あなただけのお薬ですので、
他の人にあげたりしないでください。



9 心配なことやわからないことがある場合は、お医者さんや病院の人に
聞いてください。このお薬を飲んで、いつもとちがうことがあったら、
おうちの人にすぐに言ってください。

