

使用上の注意改訂のお知らせ

選択的セロトニン再取り込み阻害剤 (SSRI)

日本薬局方 フルボキサミンマレイン酸塩錠

フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「日医工」

フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg 「日医工」

フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg 「日医工」

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社
富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいようお願い申し上げます。

<改訂内容> (_____ : 自主改訂)

改 訂 後			現 行		
3. 相互作用 (2) 併用注意 (併用に注意すること)			3. 相互作用 (2) 併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
セロトニン作用を有する薬剤 炭酸リチウム、 L-トリプトファン含有製剤 (アミノ酸製剤、経腸成分栄養剤等)、 トリプタン系薬剤 (スマトリプタンコハク酸塩等)、 選択的セロトニン再取り込み阻害剤、 トラマドール塩酸塩、 リネゾリド <u>メチルチオニニウム塩化物水和物 (メチレンブルー)</u> 等 セイヨウオトギリソウ (St. John's Wort, セント・ジョーンズ・ワート) 含有食品	セロトニン症候群等のセロトニン作用による症状があらわれるおそれがあるので、減量するなど、観察を十分に行いながら慎重に投与すること。	セロトニン作用を相互に増強させるためと考えられる。	セロトニン作用を有する薬剤 炭酸リチウム、 L-トリプトファン含有製剤 (アミノ酸製剤、経腸成分栄養剤等)、 トリプタン系薬剤 (スマトリプタンコハク酸塩等)、 選択的セロトニン再取り込み阻害剤、 トラマドール塩酸塩、 リネゾリド等 セイヨウオトギリソウ (St. John's Wort, セント・ジョーンズ・ワート) 含有食品	セロトニン症候群等のセロトニン作用による症状があらわれるおそれがあるので、減量するなど、観察を十分に行いながら慎重に投与すること。	セロトニン作用を相互に増強させるためと考えられる。
(現行どおり)			(略)		

*改訂内容につきましては DSU No.242 に掲載の予定です。

<改訂理由>

- ・ メチルチオニウム塩化物水和物製剤（メチレンブルー）の「使用上の注意」の「相互作用」の項において、本剤が併用注意とされていることから、本剤においてもメチルチオニウム塩化物水和物製剤を併用注意とし、注意喚起を行うことといたしました。

なお、改訂後の添付文書は日医工株式会社ホームページ

http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine_m_seihin.html

及び医薬品医療機器情報提供ホームページ <http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>
に掲載いたします。