

アルガトロバン注射液 10mg「日医工」

～本剤の投与速度に関して～

医療関係者の先生方へ

日医工株式会社

本剤は、アルガトロバン水和物濃度が 10mg/20mL となっています。

アルガトロバン先発製剤の濃度（10mg/2mL）とは異なります。

ご使用される際には本剤が先発製剤の 10 分の 1 の濃度であることにご留意ください。

特に「ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）Ⅱ型（発症リスクのある場合を含む）における経皮的冠インターベンション施行時の血液凝固防止」及び「ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）Ⅱ型における血栓症の発症抑制」にご使用される際には次の表をご参照ください。

- アルガトロバン水和物 0.1mg/kg を 3～5 分かけて緩徐に静脈内投与する場合

| 体重 | 0.1mg/kg | |
|------|-----------------------|------------|
| | アルガトロバン水和物として (mg) | 本剤として (mL) |
| 40kg | 4.0 | 8.0 |
| 50kg | 5.0 | 10.0 |
| 60kg | 6.0 | 12.0 |
| 70kg | 7.0 | 14.0 |

- アルガトロバン水和物 6 μ g/kg/分 で静脈内持続投与する場合

| 体重 | 6 μ g/kg/分 | |
|------|-------------------------|--------------|
| | アルガトロバン水和物として (mg/時) | 本剤として (mL/時) |
| 40kg | 14.4 | 28.8 |
| 50kg | 18.0 | 36.0 |
| 60kg | 21.6 | 43.2 |
| 70kg | 25.2 | 50.4 |

- アルガトロバン水和物 0.7 μ g/kg/分 及び 0.2 μ g/kg/分 で静脈内持続投与する場合

| 体重 | 0.7 μ g/kg/分 | | 0.2 μ g/kg/分 | |
|------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| | アルガトロバン 水和物として (mg/時) | 本剤として (mL/時) | アルガトロバン 水和物として (mg/時) | 本剤として (mL/時) |
| 40kg | 1.7 | 3.4 | 0.5 | 1.0 |
| 50kg | 2.1 | 4.2 | 0.6 | 1.2 |
| 60kg | 2.5 | 5.0 | 0.7 | 1.4 |
| 70kg | 2.9 | 5.8 | 0.8 | 1.6 |