

使用上の注意改訂のお知らせ

セフェム系抗生物質製剤

日本薬局方 注射用セフォチアム塩酸塩

セフォチアム塩酸塩静注用 0.25g「日医工」

セフォチアム塩酸塩静注用 0.5g「日医工」

セフォチアム塩酸塩静注用 1g「日医工」

セフォチアム静注用 1g バッグ「日医工」

販売元 日医工株式会社
富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21
製造販売元 日医工ファーマ株式会社

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容>（ ：削除）

改訂後	現行
8. 臨床検査結果に及ぼす影響 (1) テステープ反応を除くベネディクト試薬、フェーリング試薬による尿糖検査では、偽陽性を呈することがあるので注意すること。 (2)： 現行どおり	8. 臨床検査結果に及ぼす影響 (1) テステープ反応を除くベネディクト試薬、フェーリング試薬、 <u>クリニテスト</u> による尿糖検査では、偽陽性を呈することがあるので注意すること。 (2)： 略

<改訂理由>

- 国内においてクリニテストがすでに販売中止されていることから、「臨床検査結果に及ぼす影響」の項より記載を削除いたしました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報 No.273」(2018年10月発行)に掲載の予定です。

また、改訂後の添付文書は医薬品医療機器総合機構ホームページ (<http://www.pmda.go.jp/>) ならびに弊社ホームページ「医療関係者の皆さまへ」 (<https://www.nichiiko.co.jp/medicine/>) に掲載いたします。