

▶ 副作用について

- 次の症状に気づいたら、**すぐに主治医または薬剤師に連絡してください。**



意識の
低下・消失



筋肉のこわばり



体の震え




胸の不快感
動悸

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

▶ 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の方に譲ったり渡したりしないでください。



エスシタロプラム錠「日医工」 を服用される患者さまと ご家族の方へ

このお薬は、
抑うつ気分や不安を和らげる
お薬です。

服用する前に必ずお読みください

- 次の方はこのお薬を服用することはできません。
必ず主治医に相談してください。



- ・過去にエスシタロプラム錠に含まれる成分で過敏症のあった方
- ・セレギリン塩酸塩、ラサギリンメシル酸塩、サフィナミドメシル酸塩を服用している方、あるいは服用を中止してから14日間以内の方
- ・ピモジドを服用している方
- ・QT延長(先天性QT延長症候群等)のある方

※現在、不整脈、狭心症、心筋梗塞、心不全といった心臓の病気の治療を受けている方や今まで心電図検査で何らかの指摘を受けたことがある方は、QT延長がある可能性がありますので、主治医にお伝えください。

●次の方はこのお薬を服用する際に特に注意が必要です。
服用する前に主治医または薬剤師に相談してください。

- ・QT延長を起こすことが知られているお薬を服用している方、うっ血性心不全、低カリウム血症のある方
 - ・肝臓に障害のある方、腎臓に高度の障害のある方
 - ・死にたいと強く思ったり考えたりしたことがある方
 - ・そううつ病の方
 - ・脳に器質的な障害がある方、または統合失調症になることが考えられる方
 - ・衝動的な行動を起こしやすい病気を合併している方
 - ・てんかん等のけいれんを起こす病気をお持ちの方、または過去にてんかん等のけいれんがあった方
 - ・出血の危険性を高める薬剤を使用している方、出血しやすい方
 - ・エスシタロプラム錠「日医工」を分解(代謝)する酵素であるCYP2C19の活性が遺伝的に欠損している方(Poor Metabolizer)
 - ・閉塞隅角緑内障の方
 - ・小児や高齢の方
 - ・妊婦または妊娠している可能性のある方、授乳中の方
- このお薬には一緒に服用してはいけないお薬や注意が必要なお薬があります。他にお薬を服用している場合や新たに服用する場合は、必ず主治医に相談してください。また、他の病院を受診する場合や薬局で他のお薬を購入する場合には、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

▶飲み方について

- ①1日1回夕食後に決められた錠数を服用してください。
- ②飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。

▶服用中の注意点

- 症状が良くなってきたから、または副作用がきつから、といって自己判断で服用を中止したり量を減らしたりすると、症状や副作用の悪化が見られることがあります。**必ず主治医または薬剤師の指示どおりに服用してください。**
- このお薬の服用で、**不安が強くなり死にたいという気持ちになったり、イライラして人に対して攻撃的になったりすることがあります。**
ご自身の状態に変化を感じた場合には、ご家族や主治医または薬剤師に相談してください。
- ご家族の方は、病気の症状が悪化する可能性について主治医から十分に説明を受けてください。**病状の変化に気づかれた場合には、主治医または薬剤師に相談してください。**
- このお薬の服用中は、**アルコールやセイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)含有食品を控えてください。**このお薬の作用を強める恐れがあります。
- このお薬の服用中に、眠気やめまい等の症状があらわれることがあるので、**自動車の運転等危険を伴う機械を操作する時は、十分に注意してください。**
- お薬の効果の確認や副作用を早く見つけるためにも、定期的に診察を受けてください。

