

ピルフェニドン錠200mg「日医工」 を服用される方へ

ピルフェニドン錠200mg「日医工」を服用する際には光線過敏症(日光にさらされた部分の赤みや炎症、かゆみ・軽い痛み・刺激感を伴う皮疹などの症状)があらわれることがあります。このような症状が認められた場合には、主治医の先生にご相談ください。

光線過敏症の対策は、可能な限り日光(紫外線)を防御することです。

- 外出時には天候にかかわらず、長袖、帽子などを着用しましょう。
- 顔、首、手などに日焼け止め(SPF50+、PA+++以上)を塗ることも光線過敏症の防止に有効です。

紫外線から保護するもの



首筋にカバーの付いた帽子



日傘




長い手袋



スカーフやマフラー




サングラス




マスク



サンスクリーン



遮光カーテン



紫外線防止フィルム



日医工株式会社

2020年6月作成 N202000054

服用される前の注意点

- 次の方は、このお薬を使用することはできません。
 - 過去にピルフェニドンが含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある方
- 次の方は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師にお伝えください。
 - 肝臓に障害のある方
 - 腎臓に障害のある方
 - 高齢の方
- このお薬には併用を注意すべきお薬があります。他のお薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

服用中の注意点

- 眠気、めまい、ふらつきがおこることがあるため、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
- 肝機能障害や黄疸があらわれることがあるため、定期的に肝機能検査が行われます。
- 妊婦または妊娠している可能性がある方は医師に相談してください。
- 授乳を避けてください。
- タバコ(喫煙)はこのお薬に影響しますので、控えてください。
- 次のような症状があらわれた場合は、ただちに主治医または薬剤師に相談してください。

からだのだるい、白目が黄色くなる、吐き気、嘔吐(おうと)、食欲不振、かゆみ、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、尿が褐色になる、発熱、のどの痛み

保管等に関する注意点

- 直射日光と高温多湿を避けて保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の方(親、兄弟、姉妹、友人など)に絶対に渡さないでください。

ピルフェニドン錠200mg「日医工」 を服用される方へ

ピルフェニドン錠200mg「日医工」を服用する際には光線過敏症(日光にさらされた部分の赤みや炎症、かゆみ・軽い痛み・刺激感を伴う皮疹などの症状)があらわれることがあります。このような症状が認められた場合には、主治医の先生にご相談ください。

光線過敏症の対策は、可能な限り日光(紫外線)を防御することです。

- 外出時には天候にかかわらず、長袖、帽子などを着用しましょう。
- 顔、首、手などに日焼け止め(SPF50+、PA+++以上)を塗ることも光線過敏症の防止に有効です。

紫外線から保護するもの



首筋にカバーの付いた帽子



日傘




長い手袋



スカーフやマフラー




サングラス




マスク



サンスクリーン



遮光カーテン



紫外線防止フィルム



日医工 株式会社

2020年6月作成 N202000054

服用される前の注意点

- 次の方は、このお薬を使用することはできません。
 - 過去にピルフェニドンが含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある方
- 次の方は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師にお伝えください。
 - 肝臓に障害のある方
 - 腎臓に障害のある方
 - 高齢の方
- このお薬には併用を注意すべきお薬があります。他のお薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

服用中の注意点

- 眠気、めまい、ふらつきがおこることがあるため、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
- 肝機能障害や黄疸があらわれることがあるため、定期的に肝機能検査が行われます。
- 妊婦または妊娠している可能性がある方は医師に相談してください。
- 授乳を避けてください。
- タバコ(喫煙)はこのお薬に影響しますので、控えてください。
- 次のような症状があらわれた場合は、ただちに主治医または薬剤師に相談してください。

からだのだるい、白目が黄色くなる、吐き気、嘔吐(おうと)、食欲不振、かゆみ、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、尿が褐色になる、発熱、のどの痛み

保管等に関する注意点

- 直射日光と高温多湿を避けて保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の方(親、兄弟、姉妹、友人など)に絶対に渡さないでください。