

リマプロストアルファデクス錠 5 μ g「日医工」を服用される方へ

へいそくせいけっせんけっかんえん
このお薬は閉塞性血栓血管炎の症状改善および後天性
ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう
の腰部脊柱管狭窄症の自覚症状と歩行能力の改善に
使用されるお薬です。

先発医薬品と原薬、添加物および製法などが同一の
オーソライズド・ジェネリック医薬品*です。

(*先発医薬品メーカーの許諾を受けたジェネリック医薬品)



オモテ




ウラ

■ 飲み方について

- 主治医または薬剤師の指示どおりに服用してください。
- 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。

■ 副作用について

このお薬の服用中に次の症状に気づいた場合には、主治医または薬剤師に連絡してください。



●体がだるい



●食欲がない



●皮膚や白目が黄色くなる

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、主治医または薬剤師に気軽に相談してください。

■ 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温・湿気を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。

リマプロストアルファデクス錠 5 μ g「日医工」を服用される方へ

へいそくせいけっせんけっかんえん
このお薬は閉塞性血栓血管炎の症状改善および後天性
ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう
の腰部脊柱管狭窄症の自覚症状と歩行能力の改善に
使用されるお薬です。

先発医薬品と原薬、添加物および製法などが同一の
オーソライズド・ジェネリック医薬品*です。

(*先発医薬品メーカーの許諾を受けたジェネリック医薬品)



オモテ




ウラ

■ 飲み方について

- 主治医または薬剤師の指示どおりに服用してください。
- 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。

■ 副作用について

このお薬の服用中に次の症状に気づいた場合には、主治医または薬剤師に連絡してください。



●体がだるい



●食欲がない



●皮膚や白目が黄色くなる

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、主治医または薬剤師に気軽に相談してください。

■ 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温・湿気を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。