

エルデカルシトールカプセル「日医工」 を服用される方へ

このお薬は、カルシウムの吸収を助け、骨を強くする、
骨粗しょう症のお薬です。



エルデカルシトールカプセル0.5µg「日医工」

エルデカルシトールカプセル0.75µg「日医工」

服用する前に必ずお読みください

- 妊娠または妊娠している可能性のある方、授乳中の方はこのお薬を服用しないでください。
- 妊娠する可能性のある方は医師に相談してください。服用前に妊娠検査を受け、服用期間中は必ず避妊してください。
- 服用中に妊娠したと考えられる場合は、すぐに医師に相談してください。

飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに、継続して服用することが大切です。
- 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。
- お薬がつまみにくい場合は、以下の取り出し方をお試ください。



小さなカップなどの
容器の中に押し出す

数枚のティッシュペーパーを
広げたところに押し出す

服用中の注意点

- このお薬の服用中は、血液中のカルシウムの検査がありますので**定期的に受診してください**。
- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬やサプリメントがあります。**他のお薬やサプリメントを服用する場合には、必ず医師または薬剤師に相談してください**。

副作用について

- 次の症状に気づいたら、**すぐに医師または薬剤師に連絡してください**。



この他にも気になる症状があらわれた場合や、わからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください**。

保管等に関する注意点

- 光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- 服用時間が同じお薬ごとに一包みにまとめてある場合には、**服用される時間まで薬袋から出さないようにしてください**。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。

エルデカルシトールカプセル「日医工」 を服用される方へ

このお薬は、カルシウムの吸収を助け、骨を強くする、
骨粗しょう症のお薬です。



エルデカルシトールカプセル0.5µg「日医工」

エルデカルシトールカプセル0.75µg「日医工」

服用する前に必ずお読みください

- 妊娠または妊娠している可能性のある方、授乳中の方はこのお薬を服用しないでください。
- 妊娠する可能性のある方は医師に相談してください。服用前に妊娠検査を受け、服用期間中は必ず避妊してください。
- 服用中に妊娠したと考えられる場合は、すぐに医師に相談してください。

飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに、継続して服用することが大切です。
- 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。
- お薬がつまみにくい場合は、以下の取り出し方をお試しください。



小さなカップなどの
容器の中に押し出す

数枚のティッシュペーパーを
広げたところに押し出す

服用中の注意点

- このお薬の服用中は、血液中のカルシウムの検査がありますので**定期的に受診してください**。
- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬やサプリメントがあります。**他のお薬やサプリメントを服用する場合には、必ず医師または薬剤師に相談してください**。

副作用について

- 次の症状に気づいたら、**すぐに医師または薬剤師に連絡してください**。



この他にも気になる症状があらわれた場合や、わからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください**。

保管等に関する注意点

- 光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- 服用時間が同じお薬ごとに一包みにまとめてある場合には、**服用される時間まで薬袋から出さないようにしてください**。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。