

アシクロビル内服ゼリー「日医工」 を服用されるお子様の保護者の方へ

1日4回服用

このお薬は、単純ヘルペスウイルスや


すいとう たいじょうほうしん

水痘・帯状疱疹ウイルスの増殖をおさえる抗ウイルス剤です。


▶ 飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。自己判断でお薬をやめたり、服用量をかえたりしないでください。
- 服用する時間は下記の時刻を目安にしてください。


朝食後




昼食後



おやつの後




就寝前




- 飲み忘れに気づいた場合は、気がついた時にできるだけ早く1回分を服用してください。ただし、次に服用する時間が近い場合には1回とばして、次の時間に1回分を服用してください。決して2回分を一度に服用しないでください。


▶ 内服ゼリーの飲み方



白いゼリー部分を上にし
切り口の下を持ちます



切り口のところから完全に
切り取ります



空気部分を指で矢印の方向
にゆっくり押し、中のゼリー
を出して服用します


- 開封後はすみやかに服用し、残った分は捨ててください。
- 包装のまま服用しないでください。

▶ 服用中の注意点

- **このお薬の服用中は普段より多めに水分を取るように心がけてください。**脱水状態になると副作用が起きやすくなります。ただし、**水分を制限されている場合は医師の指示に従ってください。**



- 指示どおりに飲み続けても**症状が改善しなかったり悪化した場合には、できるだけ早く受診してください。**
- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**



▶ 副作用について

- 次の症状に気づいたら、**お薬の服用をやめてただちに受診してください。**



尿の量が
減る



体のむくみや
だるさ



幻覚、妄想



興奮、抑うつ

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

▶ 保管等に関する注意点

- 誤用をさけるために、他の容器に移し替えて保存しないでください。
- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- 上の重いものをのせないでください。
- 携帯するときは、折り曲げないようにご注意ください。
- このお薬はお子様だけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。

