

# ガランタミンOD錠「日医工」

を服用される方とご家族・介護者の方へ

このお薬は、アルツハイマー型認知症症状の進行を遅らせるお薬です。



オモテ ウラ



オモテ ウラ



オモテ ウラ



ガランタミンOD錠4mg「日医工」



ガランタミンOD錠8mg「日医工」



ガランタミンOD錠12mg「日医工」

## 服用する前に

- 次の方は、服用する前に必ず医師または薬剤師に相談してください。
  - ・以前にお薬や食べ物でかゆみや発疹などのアレルギー症状が出たことのある方
  - ・心臓や肝臓、腎臓に病気のある方
  - ・胃潰瘍や十二指腸潰瘍になったことのある方
  - ・消化管閉塞のある方 または消化管の手術直後の方
  - ・下部尿路閉塞のある方 膀胱の手術直後の方
  - ・てんかんなどのけいれんをおこす病気のある方、または過去にけいれんをおこしたことのある方
  - ・喘息や肺の病気になったことのある方
  - ・パーキンソン病などの錐体外路障害のある方
  - ・妊婦または妊娠している可能性のある方 授乳中の方
  - ・現在、他の薬を服用している方

## 服用方法

- 必ず医師または薬剤師の指示どおりに服用してください。自己判断で服用を中止したり、お薬の量を増やしたり減らしたりしないでください。
- 水なしでも服用できる口腔内崩壊錠です。口中で唾液を含ませ、舌で軽く潰すと速やかに溶けるので唾液と一緒に飲み込んでください。水またはぬるま湯で服用することもできます。寝たままでは水なしで服用しないでください。
- 服用の量および回数は次のとおりです。

開始～4週間	4週間で以降継続	症状に応じて
<b>4mgを1日2回</b> 〔4mg×2錠〕 または 〔8mg半割×2〕	<b>8mgを1日2回</b> 〔8mg×2錠〕	<b>12mgを1日2回</b> 〔12mg×2錠〕
		

※症状によってお薬の量が変わることがあります。

- 飲み忘れに気が付いた時は、すぐに1回分を服用してください。ただし、次に服用するまでの時間が短い場合は1回とばして、次の時間に1回分を服用してください。決して一度に2回分を服用しないでください。
- 誤って多く服用した場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

## 服用中の注意点

- 脈が遅くなる、脈がみだれるなどにより、めまい、動悸、気を失うことがあるので、このような症状があらわれた場合は、ただちに医師または薬剤師に相談してください。
- アルツハイマー型認知症では自動車の運転などの機械操作能力が低下する可能性があります。また、このお薬の服用で、めまい、眠気などの症状があらわれることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は注意してください。
- 体重が減少することがあります。体重が減り始めた場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- このお薬には併用を注意すべきお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師にお伝えください。

## 副作用の注意点

次のような症状があらわれた場合は、ただちに医師または薬剤師に相談してください。



食欲不振



吐き気



高熱



赤くなった皮膚上に  
小さなブツブツが出る



だるい



白目や皮膚が黄色くなる



赤褐色尿



筋肉の痛み

これら以外にも気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避けて保管してください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人(親、兄弟、姉妹、友人など)に絶対に渡さないでください。