

◆ 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。

ソリフェナシンコハク酸塩 錠／OD錠「日医工」 を服用される方へ

このお薬は、^{かかつどうぼうこう}**過活動膀胱**における症状の改善に使用されるお薬です。

先発医薬品と**原薬**、**添加物**および**製法**などが同一の
オーソライズド・ジェネリック医薬品*です。

(*先発医薬品メーカーの許諾を受けたジェネリック医薬品)



◆ 飲み方について

- **医師または薬剤師の指示通りに服用してください。**
自己判断で服用を中止したり、量を増やしたり減らしたりすると、症状が悪化することがあります。
- 飲み忘れに気づいても、**決して2回分を一度に服用しないでください。**
- OD錠は水なしでも服用することができます。舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。ただし、**水なしの場合には寝たままで服用しないでください。**
- このお薬は、かみ砕かずに服用してください。

◆ 服用中の注意点

- このお薬を服用すると、眼のかすみやめまい、眠気などがあらわれることがあります。**高い所での作業、自動車の運転など危険を伴う機械を操作する場合には注意してください。**



- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**

◆ 副作用について

- このお薬を服用すると口の渇きや便秘になることがあります。症状が辛い場合には、医師または薬剤師に相談してください。



● 口が渇く

対 応 策

うがいをする、ガムをかむ、飴をなめるなどして、唾液の分泌を促すようにしましょう。
軽い運動をすることや食事の際によく噛んで食べることも唾液の分泌を促します。



● 便秘

対 応 策

野菜や果物など食物繊維の多い食事を摂るようにしましょう。
便意を我慢せず、朝の排便を習慣づけるようにしましょう。

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**