


ケチフェンシロップ0.02%「日医工」を服用される方へ

〔使用および保管上の注意〕

- ①眼、鼻、耳に使用しないでください。
- ②誤用をさけるため、他の容器に移しかえて保存しないでください。
- ③開封後はすみやかに服用し、残液は捨ててください。
- ④光を避けて保存してください。
- ⑤子供の手のとどかないところに保管してください。また、使用後の容器は、子供がまちがって飲み込むことのないように捨ててください。

禁注射

内服用



●お薬の飲み方




ケチフェンシロップ0.02%「日医工」を服用される方へ

〔使用および保管上の注意〕

- ①眼、鼻、耳に使用しないでください。
- ②誤用をさけるため、他の容器に移しかえて保存しないでください。
- ③開封後はすみやかに服用し、残液は捨ててください。
- ④光を避けて保存してください。
- ⑤子供の手のとどかないところに保管してください。また、使用後の容器は、子供がまちがって飲み込むことのないように捨ててください。

禁注射

内服用



●お薬の飲み方



ケチフェンシロップ0.02%「日医工」を服用される方へ

〔使用および保管上の注意〕

- ①眼、鼻、耳に使用しないでください。
- ②誤用をさけるため、他の容器に移しかえて保存しないでください。
- ③開封後はすみやかに服用し、残液は捨ててください。
- ④光を避けて保存してください。
- ⑤子供の手のとどかないところに保管してください。また、使用後の容器は、子供がまちがって飲み込むことのないように捨ててください。

禁注射

内服用



●お薬の飲み方




ケチフェンシロップ0.02%「日医工」を服用される方へ

〔使用および保管上の注意〕

- ①眼、鼻、耳に使用しないでください。
- ②誤用をさけるため、他の容器に移しかえて保存しないでください。
- ③開封後はすみやかに服用し、残液は捨ててください。
- ④光を避けて保存してください。
- ⑤子供の手のとどかないところに保管してください。また、使用後の容器は、子供がまちがって飲み込むことのないように捨ててください。

禁注射

内服用



●お薬の飲み方

