

使用上の注意改訂のお知らせ

抗血小板剤

日本薬局方 チクロピジン塩酸塩錠

チクロピジン塩酸塩錠 100mg「日医工」

チクロピジン塩酸塩細粒 10%「日医工」

チクロピジン塩酸塩細粒

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社

富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容>（ ：自主改訂）

改 訂 後			現 行		
3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）			3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
（現行どおり）			（略）		
<u>選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI）</u> <u>フルボキサミンマレイン酸塩</u> <u>塩酸セルトラリン</u> <u>等</u>	<u>出血を助長するおそれがある。</u>	<u>SSRI の投与により血小板凝集が阻害され、本剤との併用により出血を助長すると考えられる。</u>	← 記載なし		

<改訂理由>

- ・ 類薬（クロピドグレル硫酸塩）の使用上の注意において、「選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI）」が「併用注意」とされていることから、本剤においても「選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI）」を「相互作用」の「併用注意」の項に追記いたしました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報 No.272」(2018年8月発行)に掲載の予定です。

また、改訂後の添付文書は医薬品医療機器総合機構ホームページ (<http://www.pmda.go.jp/>) ならびに弊社ホームページ「医療関係者の皆さまへ」 (<https://www.nichiiko.co.jp/medicine/>) に掲載いたします。