

トリアゾラム錠0.25mg「日医工」を服用される方へ

このお薬は不眠症の治療薬です。必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。この錠剤は青～淡青色で色味が異なる場合がありますが、品質に問題ありません。

1. もうろう感、ふらふら感、夢遊症状、中途覚醒時の出来事をおぼえていないことなどがあるので注意してください。
2. 寝る支度をすませてから、寝る直前に服用してください。
3. 一度寝てから、短時間後に起きて仕事などをする可能性のあるときは、服用しないでください。

裏面も必ずお読みください。

トリアゾラム錠0.25mg「日医工」を服用される方へ

このお薬は不眠症の治療薬です。必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。この錠剤は青～淡青色で色味が異なる場合がありますが、品質に問題ありません。

1. もうろう感、ふらふら感、夢遊症状、中途覚醒時の出来事をおぼえていないことなどがあるので注意してください。
2. 寝る支度をすませてから、寝る直前に服用してください。
3. 一度寝てから、短時間後に起きて仕事などをする可能性のあるときは、服用しないでください。

裏面も必ずお読みください。

トリアゾラム錠0.25mg「日医工」を服用される方へ

このお薬は不眠症の治療薬です。必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。この錠剤は青～淡青色で色味が異なる場合がありますが、品質に問題ありません。

1. もうろう感、ふらふら感、夢遊症状、中途覚醒時の出来事をおぼえていないことなどがあるので注意してください。
2. 寝る支度をすませてから、寝る直前に服用してください。
3. 一度寝てから、短時間後に起きて仕事などをする可能性のあるときは、服用しないでください。

裏面も必ずお読みください。

トリアゾラム錠0.25mg「日医工」を服用される方へ

このお薬は不眠症の治療薬です。必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。この錠剤は青～淡青色で色味が異なる場合がありますが、品質に問題ありません。

1. もうろう感、ふらふら感、夢遊症状、中途覚醒時の出来事をおぼえていないことなどがあるので注意してください。
2. 寝る支度をすませてから、寝る直前に服用してください。
3. 一度寝てから、短時間後に起きて仕事などをする可能性のあるときは、服用しないでください。

裏面も必ずお読みください。

トリアゾラム錠0.25mg「日医工」を服用される方へ

このお薬は不眠症の治療薬です。必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。この錠剤は青～淡青色で色味が異なる場合がありますが、品質に問題ありません。

1. もうろう感、ふらふら感、夢遊症状、中途覚醒時の出来事をおぼえていないことなどがあるので注意してください。
2. 寝る支度をすませてから、寝る直前に服用してください。
3. 一度寝てから、短時間後に起きて仕事などをする可能性のあるときは、服用しないでください。

裏面も必ずお読みください。

トリアゾラム錠0.25mg「日医工」を服用される方へ

このお薬は不眠症の治療薬です。必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。この錠剤は青～淡青色で色味が異なる場合がありますが、品質に問題ありません。

1. もうろう感、ふらふら感、夢遊症状、中途覚醒時の出来事をおぼえていないことなどがあるので注意してください。
2. 寝る支度をすませてから、寝る直前に服用してください。
3. 一度寝てから、短時間後に起きて仕事などをする可能性のあるときは、服用しないでください。

裏面も必ずお読みください。

4. 翌朝以降に眠気が残ったり、注意や集中することができなくなったりすることがあるので、自動車の運転や危険を伴う機械の操作などをしないでください。
5. このお薬を服用する前後は、アルコール類を飲まないでください。
6. 自分の判断で、服用を中止したり、お薬の量を増やしたりしないでください。必ず医師に相談してください。
7. このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に絶対に渡さないでください。



0322040-3

N202300145

4. 翌朝以降に眠気が残ったり、注意や集中することができなくなったりすることがあるので、自動車の運転や危険を伴う機械の操作などをしないでください。
5. このお薬を服用する前後は、アルコール類を飲まないでください。
6. 自分の判断で、服用を中止したり、お薬の量を増やしたりしないでください。必ず医師に相談してください。
7. このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に絶対に渡さないでください。



0322040-3

N202300145

4. 翌朝以降に眠気が残ったり、注意や集中することができなくなったりすることがあるので、自動車の運転や危険を伴う機械の操作などをしないでください。
5. このお薬を服用する前後は、アルコール類を飲まないでください。
6. 自分の判断で、服用を中止したり、お薬の量を増やしたりしないでください。必ず医師に相談してください。
7. このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に絶対に渡さないでください。



0322040-3

N202300145

4. 翌朝以降に眠気が残ったり、注意や集中することができなくなったりすることがあるので、自動車の運転や危険を伴う機械の操作などをしないでください。
5. このお薬を服用する前後は、アルコール類を飲まないでください。
6. 自分の判断で、服用を中止したり、お薬の量を増やしたりしないでください。必ず医師に相談してください。
7. このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に絶対に渡さないでください。



0322040-3

N202300145

4. 翌朝以降に眠気が残ったり、注意や集中することができなくなったりすることがあるので、自動車の運転や危険を伴う機械の操作などをしないでください。
5. このお薬を服用する前後は、アルコール類を飲まないでください。
6. 自分の判断で、服用を中止したり、お薬の量を増やしたりしないでください。必ず医師に相談してください。
7. このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に絶対に渡さないでください。



0322040-3

N202300145

4. 翌朝以降に眠気が残ったり、注意や集中することができなくなったりすることがあるので、自動車の運転や危険を伴う機械の操作などをしないでください。
5. このお薬を服用する前後は、アルコール類を飲まないでください。
6. 自分の判断で、服用を中止したり、お薬の量を増やしたりしないでください。必ず医師に相談してください。
7. このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に絶対に渡さないでください。



0322040-3

N202300145

トリアゾラム錠0.25mg「日医工」を服用される方へ

このお薬は不眠症の治療薬です。必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。この錠剤は青～淡青色で色味が異なる場合がありますが、品質に問題ありません。

1. もうろう感、ふらふら感、夢遊症状、中途覚醒時の出来事をおぼえていないことなどがあるので注意してください。
2. 寝る支度をすませてから、寝る直前に服用してください。
3. 一度寝てから、短時間後に起きて仕事などをする可能性のあるときは、服用しないでください。

裏面も必ずお読みください。

トリアゾラム錠0.25mg「日医工」を服用される方へ

このお薬は不眠症の治療薬です。必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。この錠剤は青～淡青色で色味が異なる場合がありますが、品質に問題ありません。

1. もうろう感、ふらふら感、夢遊症状、中途覚醒時の出来事をおぼえていないことなどがあるので注意してください。
2. 寝る支度をすませてから、寝る直前に服用してください。
3. 一度寝てから、短時間後に起きて仕事などをする可能性のあるときは、服用しないでください。

裏面も必ずお読みください。

トリアゾラム錠0.25mg「日医工」を服用される方へ

このお薬は不眠症の治療薬です。必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。この錠剤は青～淡青色で色味が異なる場合がありますが、品質に問題ありません。

1. もうろう感、ふらふら感、夢遊症状、中途覚醒時の出来事をおぼえていないことなどがあるので注意してください。
2. 寝る支度をすませてから、寝る直前に服用してください。
3. 一度寝てから、短時間後に起きて仕事などをする可能性のあるときは、服用しないでください。

裏面も必ずお読みください。

トリアゾラム錠0.25mg「日医工」を服用される方へ

このお薬は不眠症の治療薬です。必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。この錠剤は青～淡青色で色味が異なる場合がありますが、品質に問題ありません。

1. もうろう感、ふらふら感、夢遊症状、中途覚醒時の出来事をおぼえていないことなどがあるので注意してください。
2. 寝る支度をすませてから、寝る直前に服用してください。
3. 一度寝てから、短時間後に起きて仕事などをする可能性のあるときは、服用しないでください。

裏面も必ずお読みください。

トリアゾラム錠0.25mg「日医工」を服用される方へ

このお薬は不眠症の治療薬です。必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。この錠剤は青～淡青色で色味が異なる場合がありますが、品質に問題ありません。

1. もうろう感、ふらふら感、夢遊症状、中途覚醒時の出来事をおぼえていないことなどがあるので注意してください。
2. 寝る支度をすませてから、寝る直前に服用してください。
3. 一度寝てから、短時間後に起きて仕事などをする可能性のあるときは、服用しないでください。

裏面も必ずお読みください。

トリアゾラム錠0.25mg「日医工」を服用される方へ

このお薬は不眠症の治療薬です。必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。この錠剤は青～淡青色で色味が異なる場合がありますが、品質に問題ありません。

1. もうろう感、ふらふら感、夢遊症状、中途覚醒時の出来事をおぼえていないことなどがあるので注意してください。
2. 寝る支度をすませてから、寝る直前に服用してください。
3. 一度寝てから、短時間後に起きて仕事などをする可能性のあるときは、服用しないでください。

裏面も必ずお読みください。

4. 翌朝以降に眠気が残ったり、注意や集中することができなくなったりすることがあるので、自動車の運転や危険を伴う機械の操作などをしないでください。
5. このお薬を服用する前後は、アルコール類を飲まないでください。
6. 自分の判断で、服用を中止したり、お薬の量を増やしたりしないでください。必ず医師に相談してください。
7. このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に絶対に渡さないでください。



0322040-3

N202300145

4. 翌朝以降に眠気が残ったり、注意や集中することができなくなったりすることがあるので、自動車の運転や危険を伴う機械の操作などをしないでください。
5. このお薬を服用する前後は、アルコール類を飲まないでください。
6. 自分の判断で、服用を中止したり、お薬の量を増やしたりしないでください。必ず医師に相談してください。
7. このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に絶対に渡さないでください。



0322040-3

N202300145

4. 翌朝以降に眠気が残ったり、注意や集中することができなくなったりすることがあるので、自動車の運転や危険を伴う機械の操作などをしないでください。
5. このお薬を服用する前後は、アルコール類を飲まないでください。
6. 自分の判断で、服用を中止したり、お薬の量を増やしたりしないでください。必ず医師に相談してください。
7. このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に絶対に渡さないでください。



0322040-3

N202300145

4. 翌朝以降に眠気が残ったり、注意や集中することができなくなったりすることがあるので、自動車の運転や危険を伴う機械の操作などをしないでください。
5. このお薬を服用する前後は、アルコール類を飲まないでください。
6. 自分の判断で、服用を中止したり、お薬の量を増やしたりしないでください。必ず医師に相談してください。
7. このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に絶対に渡さないでください。



0322040-3

N202300145

4. 翌朝以降に眠気が残ったり、注意や集中することができなくなったりすることがあるので、自動車の運転や危険を伴う機械の操作などをしないでください。
5. このお薬を服用する前後は、アルコール類を飲まないでください。
6. 自分の判断で、服用を中止したり、お薬の量を増やしたりしないでください。必ず医師に相談してください。
7. このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に絶対に渡さないでください。



0322040-3

N202300145

4. 翌朝以降に眠気が残ったり、注意や集中することができなくなったりすることがあるので、自動車の運転や危険を伴う機械の操作などをしないでください。
5. このお薬を服用する前後は、アルコール類を飲まないでください。
6. 自分の判断で、服用を中止したり、お薬の量を増やしたりしないでください。必ず医師に相談してください。
7. このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に絶対に渡さないでください。



0322040-3

N202300145