

## ジクロフェナクナトリウム坐剤「日医工」を使用される方へ

このお薬は飲み薬ではありません。肛門内に挿入してお使いください。

### 坐剤の 使い方



- ①ミシン目にそって1個を切り離します。
- ②図のように両手で左右に引きはがして取り出します。
- ③ティッシュペーパーなどで坐剤の後部をつまみ、中腰になってとがった方から肛門内に挿入し、十分差し込んだ後、立ち上がれば挿入できます。
- ④小児の場合は、図のような姿勢にし、肛門内に深く挿入して4～5秒押さえてください。
- ⑤1個の半量を使用する場合は、図のように斜めに切断してください。尚、一度溶けて固まったお薬は、有効成分が偏ることがありますので、半量では使用しないでください。

### <注意>

1. できるだけ排便後に使用してください。
2. 挿入し難い場合は、坐剤の先を指で暖め、表面を少し溶かすと入れやすくなります。
3. 挿入後、しばらくは運動を控えてください。
4. 挿入後、油様のものが排泄されることがありますが、坐剤に含まれる油分ですので心配いりません。
5. 小児の手の届かない、冷蔵庫などの涼しい所で保管ください。



2025年11月作成  
N202500138

## ジクロフェナクナトリウム坐剤「日医工」を使用される方へ

このお薬は飲み薬ではありません。肛門内に挿入してお使いください。

### 坐剤の 使い方



- ①ミシン目にそって1個を切り離します。
- ②図のように両手で左右に引きはがして取り出します。
- ③ティッシュペーパーなどで坐剤の後部をつまみ、中腰になってとがった方から肛門内に挿入し、十分差し込んだ後、立ち上がれば挿入できます。
- ④小児の場合は、図のような姿勢にし、肛門内に深く挿入して4～5秒押さえてください。
- ⑤1個の半量を使用する場合は、図のように斜めに切断してください。尚、一度溶けて固まったお薬は、有効成分が偏ることがありますので、半量では使用しないでください。

### <注意>

1. できるだけ排便後に使用してください。
2. 挿入し難い場合は、坐剤の先を指で暖め、表面を少し溶かすと入れやすくなります。
3. 挿入後、しばらくは運動を控えてください。
4. 挿入後、油様のものが排泄されることがありますが、坐剤に含まれる油分ですので心配いりません。
5. 小児の手の届かない、冷蔵庫などの涼しい所で保管ください。



2025年11月作成  
N202500138

## ジクロフェナクナトリウム坐剤「日医工」を使用される方へ

このお薬は飲み薬ではありません。肛門内に挿入してお使いください。

### 坐剤の 使い方



- ①ミシン目にそって1個を切り離します。
- ②図のように両手で左右に引きはがして取り出します。
- ③ティッシュペーパーなどで坐剤の後部をつまみ、中腰になってとがった方から肛門内に挿入し、十分差し込んだ後、立ち上がれば挿入できます。
- ④小児の場合は、図のような姿勢にし、肛門内に深く挿入して4～5秒押さえてください。
- ⑤1個の半量を使用する場合は、図のように斜めに切断してください。尚、一度溶けて固まったお薬は、有効成分が偏ることがありますので、半量では使用しないでください。

### <注意>

1. できるだけ排便後に使用してください。
2. 挿入し難い場合は、坐剤の先を指で暖め、表面を少し溶かすと入れやすくなります。
3. 挿入後、しばらくは運動を控えてください。
4. 挿入後、油様のものが排泄されることがありますが、坐剤に含まれる油分ですので心配いりません。
5. 小児の手の届かない、冷蔵庫などの涼しい所で保管ください。



2025年11月作成  
N202500138

## ジクロフェナクナトリウム坐剤「日医工」を使用される方へ

このお薬は飲み薬ではありません。肛門内に挿入してお使いください。

### 坐剤の 使い方



- ①ミシン目にそって1個を切り離します。
- ②図のように両手で左右に引きはがして取り出します。
- ③ティッシュペーパーなどで坐剤の後部をつまみ、中腰になってとがった方から肛門内に挿入し、十分差し込んだ後、立ち上がれば挿入できます。
- ④小児の場合は、図のような姿勢にし、肛門内に深く挿入して4～5秒押さえてください。
- ⑤1個の半量を使用する場合は、図のように斜めに切断してください。尚、一度溶けて固まったお薬は、有効成分が偏ることがありますので、半量では使用しないでください。

### <注意>

1. できるだけ排便後に使用してください。
2. 挿入し難い場合は、坐剤の先を指で暖め、表面を少し溶かすと入れやすくなります。
3. 挿入後、しばらくは運動を控えてください。
4. 挿入後、油様のものが排泄されることがありますが、坐剤に含まれる油分ですので心配いりません。
5. 小児の手の届かない、冷蔵庫などの涼しい所で保管ください。



2025年11月作成  
N202500138

## ジクロフェナクナトリウム坐剤「日医工」を使用される方へ

このお薬は飲み薬ではありません。肛門内に挿入してお使いください。

### 坐剤の 使い方



- ①ミシン目にそって1個を切り離します。
- ②図のように両手で左右に引きはがして取り出します。
- ③ティッシュペーパーなどで坐剤の後部をつまみ、中腰になってとがった方から肛門内に挿入し、十分差し込んだ後、立ち上がれば挿入できます。
- ④小児の場合は、図のような姿勢にし、肛門内に深く挿入して4～5秒押さえてください。
- ⑤1個の半量を使用する場合は、図のように斜めに切断してください。尚、一度溶けて固まったお薬は、有効成分が偏ることがありますので、半量では使用しないでください。

### <注意>

1. できるだけ排便後に使用してください。
2. 挿入し難い場合は、坐剤の先を指で暖め、表面を少し溶かすと入れやすくなります。
3. 挿入後、しばらくは運動を控えてください。
4. 挿入後、油様のものが排泄されることがありますが、坐剤に含まれる油分ですので心配いりません。
5. 小児の手の届かない、冷蔵庫などの涼しい所で保管ください。



2025年11月作成  
N202500138

## ジクロフェナクナトリウム坐剤「日医工」を使用される方へ

このお薬は飲み薬ではありません。肛門内に挿入してお使いください。

### 坐剤の 使い方



- ①ミシン目にそって1個を切り離します。
- ②図のように両手で左右に引きはがして取り出します。
- ③ティッシュペーパーなどで坐剤の後部をつまみ、中腰になってとがった方から肛門内に挿入し、十分差し込んだ後、立ち上がれば挿入できます。
- ④小児の場合は、図のような姿勢にし、肛門内に深く挿入して4～5秒押さえてください。
- ⑤1個の半量を使用する場合は、図のように斜めに切断してください。尚、一度溶けて固まったお薬は、有効成分が偏ることがありますので、半量では使用しないでください。

### <注意>

1. できるだけ排便後に使用してください。
2. 挿入し難い場合は、坐剤の先を指で暖め、表面を少し溶かすと入れやすくなります。
3. 挿入後、しばらくは運動を控えてください。
4. 挿入後、油様のものが排泄されることがありますが、坐剤に含まれる油分ですので心配いりません。
5. 小児の手の届かない、冷蔵庫などの涼しい所で保管ください。



2025年11月作成  
N202500138