

使用上の注意改訂のお知らせ

Ca 拮抗剤

ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「日医工」

ジルチアゼム塩酸塩錠 60mg「日医工」

ジルチアゼム塩酸塩錠

塩酸ジルチアゼム注射用 10「日医工」

塩酸ジルチアゼム注射用 50「日医工」

塩酸ジルチアゼム注射用 250「日医工」

注射用ジルチアゼム塩酸塩

持続性 Ca 拮抗剤

ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg「日医工」

ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 200mg「日医工」

ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル

製造販売元 日医工株式会社
富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<新旧対照表> (_____:自主改訂)

改 訂 後			現 行		
3. 相互作用 本剤は主として代謝酵素チトクローム P450 3A4 (CYP3A4) で代謝される。 併用注意 (併用に注意すること)			3. 相互作用 本剤は主として代謝酵素チトクローム P450 3A4 (CYP3A4) で代謝される。 併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(現行どおり)			(略)		
(現行どおり)	(現行どおり)	これらの薬剤の代謝酵素 (チトクローム P450) を阻害することにより、これらの薬剤の血中濃度を上昇させると考えられる。	(略)	(略)	これらの薬剤の代謝酵素 (チトクローム P450) を阻害することにより、これらの薬剤の血中濃度を上昇させると考えられる。
シロスタゾール	(現行どおり)		シロスタゾール	(略)	
<u>アピキサバン</u>	<u>アピキサバンの作用が</u> <u>増強することがある。</u> <u>定期的に臨床症状を</u> <u>観察し、異常が認めら</u> <u>れた場合には減量若し</u> <u>くは投与を中止する。</u>		シロスタゾール	(略)	
ピノレルビン酒石酸塩	(現行どおり)	ピノレルビン酒石酸塩	(略)	(略)	(略)
(現行どおり)	(現行どおり)	(略)	(略)	(略)	(略)
(現行どおり)			(略)		

<改訂理由>

- ・ アピキサバン製剤の「使用上の注意」において、本剤が「併用注意」とされていることから、整合をとるために本剤においても「アピキサバン」を「併用注意」の項に追記することといたしました。

* 改訂内容につきましては DSU No.247 に掲載の予定です。

なお、改訂後の添付文書は日医工ホームページ

http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine_m_seihin.html

及び医薬品医療機器情報提供ホームページ

<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に掲載致します。