

# ドパコール<sup>®</sup>配合錠 を服用される方へ

ドパコール配合錠L50、ドパコール配合錠L100、ドパコール配合錠L250はパーキンソン病・パーキンソン症候群の症状を改善するためのおくすりです。

このおくすりには以下の副作用が起こることが知られています。

## ①突発的睡眠、傾眠<sup>けい みる</sup>など

次のような症状がみられることがありますので、このおくすりを服用中は車の運転や機械の操作、高い所での作業など危険を伴う作業はしないでください。

- 前兆もなく急に眠り込んでしまう
- 眠気
- 眼の調節障害
- 注意力・集中力・反射機能の低下

(裏面につづく)

## ②衝動制御障害、ドパミン調節障害症候群

次のような症状がみられることがあります。おくすりの量を調整する必要がある場合がありますので、このような症状が出た場合は、主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。

- ギャンブルをしたい衝動を抑えられない状態
- 病的に性衝動を抑えられない状態
- むやみに買い物をしたい衝動を抑えられない状態
- むやみに食べ物を食べたい衝動を抑えられない状態
- パーキンソン病のおくすりを必要量を超えて服用したい衝動を抑えられない状態

これらの症状のほかにも、おくすりを服用して体調がおかしいと感じましたら、主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。

医師または薬剤師の連絡先