

デキサメタゾン 口腔用軟膏0.1%「日医工」 を使用される方へ

このお薬は、口内炎や舌の炎症を治療するお薬です。

- 医師または薬剤師の指示に従い、1日1回～数回患部に塗ってください。



※写真はイメージです。

このお薬には、天然由来の添加物が含まれています。
実際の製品と色味が異なる場合があります。

以下の方は、医師または薬剤師にご相談ください

- 以前にお薬を使用して、かゆみや発疹、皮膚のヒリヒリ感などのアレルギー症状が出たことのある方
- 口腔内に感染のある方（粘膜が白くなっている、痛みがある など）
- 妊婦または妊娠している可能性のある方

お薬を使用して、いつもと違う症状に気が付いた場合も、
医師または薬剤師にご相談ください。

ご使用中の注意点

- ① 手洗い・うがいをし、指先と口の中を清潔にしてください。




- ② デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「日医工」を乾いた指先にとります。（チューブの口に水分が付かないようにしてください）




- ③ 指先にとったデキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「日医工」を、患部に塗ってください。（チューブの口を患部に当てて塗らないでください）



- ④ 使用後はしばらく飲食を避けてください。



- ⑤ 塗り忘れた時は、気がついた時に塗ってください。



- ⑥ 眼やまぶたには使用しないでください。



保管等に関する注意点

- 使用後はキャップをしっかりと閉め、室温で保管してください。



デキサメタゾン 口腔用軟膏0.1%「日医工」 を使用される方へ

このお薬は、口内炎や舌の炎症を治療するお薬です。

- 医師または薬剤師の指示に従い、1日1回～数回患部に塗ってください。



※写真はイメージです。

このお薬には、天然由来の添加物が含まれています。
実際の製品と色味が異なる場合があります。

以下の方は、医師または薬剤師にご相談ください

- 以前にお薬を使用して、かゆみや発疹、皮膚のヒリヒリ感などのアレルギー症状が出たことのある方
- 口腔内に感染のある方（粘膜が白くなっている、痛みがある など）
- 妊婦または妊娠している可能性のある方

お薬を使用して、いつもと違う症状に気が付いた場合も、
医師または薬剤師にご相談ください。

ご使用中の注意点

- ① 手洗い・うがいをし、指先と口の中を清潔にしてください。




- ② デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「日医工」を乾いた指先にとります。
(チューブの口に水分が付かないようにしてください)




- ③ 指先にとったデキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「日医工」を、患部に塗ってください。
(チューブの口を患部に当てて塗らないでください)



- ④ 使用後はしばらく飲食を避けてください。



- ⑤ 塗り忘れた時は、気がついた時に塗ってください。



- ⑥ 眼やまぶたには使用しないでください。



保管等に関する注意点

- 使用後はキャップをしっかりと閉め、室温で保管してください。

