

使用上の注意改訂のお知らせ

鎮咳剤

デキストロメトルファン臭化水素酸塩散 10%「日医工」

デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物散

デキストロメトルファン臭化水素酸塩注射液 5mg「日医工」

デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物注射液

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社

富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容> (.....: 自主改訂)

改 訂 後			現 行		
2. 相互作用 本剤は、主に肝代謝酵素 CYP2D6 で代謝される。 (1) 併用禁忌（併用しないこと）： 現行どおり (2) 併用注意（併用に注意すること）			2. 相互作用 本剤は、主に肝代謝酵素 CYP2D6 で代謝される。 (1) 併用禁忌（併用しないこと）： 略 (2) 併用注意（併用に注意すること）		
薬 剤 名 等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬 剤 名 等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
薬 物 代 謝 酵 素 (CYP2D6) を阻害する薬剤 キニジン、 アミオダロン、 テルビナフィン等	本剤の血中濃度が上昇することがある。	これらの薬剤の薬物代謝酵素 (CYP2D6) 阻害作用により、本剤の代謝が阻害されるため。	薬 物 代 謝 酵 素 (CYP2D6) を阻害する薬剤 キニジン、 アミオダロン、 テルビナフィン等	本剤の血中濃度が上昇することがある。	これらの薬剤の薬物代謝酵素 (CYP2D6) 阻害作用により、本剤の代謝が阻害されるため。
<u>セロトニン作用薬</u> <u>選択的セロトニン再取り込み阻害剤 (SSRI) 等</u>	<u>セロトニン症候群等のセロトニン作用による症状があらわれることがある。</u>	<u>セロトニン作用が増強するおそれがある。</u>	← 記載なし		

\* 改訂内容につきましては DSU No.249 に掲載の予定です。

<改訂理由>

- ・ デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物製剤とセロトニン作用薬との相互作用が疑われる副作用症例の集積により、「相互作用」の「併用注意」の項に「セロトニン作用薬」を追記し、注意喚起を行うことといたしました。

なお、改訂後の添付文書は日医工株式会社ホームページ

[http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine\\_m\\_seihin.html](http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine_m_seihin.html)

及び医薬品医療機器情報提供ホームページ <http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>

に掲載いたします。