

デュタステリドカプセルAV「日医工」 を服用される方へ

このお薬は、5α還元酵素阻害薬という前立腺肥大症の治療薬です。



服用前の注意点

- 次の方は、服用する前に医師または薬剤師に相談してください。
 - 以前にお薬を服用して、かゆみや発疹などのアレルギー症状がでたことのある方
 - 肝臓に病気のある方
 - 他のお薬を服用されている方
- この薬を使用する前に、直腸診や他の前立腺がんの検査が行われます。また、このお薬を使用中にも定期的にこれらの検査が行われます。

服用上の注意点

- 必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。自己判断で服用を中止したり、お薬の量を増やしたり減らしたりしないでください。
- カプセルは噛んだり、開けたりせずに、水またはぬるま湯で服用してください。
- 飲み忘れた場合は、1回分を服用してください。ただし、次に服用する時間が近い場合には、1回とばして次の決められた時間に1回分を服用してください。決して一度に2回分を服用しないでください。

服用中の注意点

- PSA（血清前立腺特異抗原）は前立腺がんの有無の目安となる腫瘍マーカーです。このお薬は前立腺がんがあっても、服用開始6ヵ月後にPSA値を約50%減少させる作用があります。PSA検査を行う際には、必ずこのお薬を服用中であることを必ず医師に伝えてください。
- 女性や小児はカプセルから漏れた薬液に触れないでください。漏れた薬液に触れた場合には、ただちに石鹼と水で洗ってください。
- このお薬は一緒に服用してはいけないお薬や、注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用の注意点

- 以下のような症状があらわれた場合は、ただちに医師または薬剤師に相談してください。



- からだが
だるい



- 白目や皮膚が
黄色くなる



- 吐き気、嘔吐、
食欲不振

- また、勃起不全、性欲減退、乳房障害（女性化乳房、乳頭痛、乳房痛、乳房不快感）などが起こることがあります。

これら以外にも気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管等に関する注意点

- 1~30℃の室内でPTPシートのまま保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人（親、兄弟、姉妹、友人など）に絶対に渡さないでください。