

使用上の注意改訂のお知らせ

H<sub>2</sub> 受容体拮抗剤

日本薬局方 ファモチジン錠

ファモチジン錠 10mg「日医工」

ファモチジン錠 20mg「日医工」

H<sub>2</sub> 受容体拮抗剤

日本薬局方 ファモチジン散

ファモチジン散 2%「日医工」

ファモチジン散 10%「日医工」

H<sub>2</sub> 受容体拮抗剤

ファモチジンD錠 10mg「日医工」

ファモチジンD錠 20mg「日医工」

ファモチジン口腔内崩壊錠

製造販売元 日医工株式会社  
富山市総曲輪1丁目6番21

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容> ( \_\_\_\_\_ : 自主改訂)

改 訂 後		現 行	
4. 副作用 (3) その他の副作用		4. 副作用 (3) その他の副作用	
	頻度不明 (現行どおり)		頻度不明 (略)
内分泌系 <sup>注)</sup>	月経不順, 女性化乳房, <u>乳汁漏出症</u>	内分泌系 <sup>注)</sup>	月経不順, 女性化乳房
そ の 他	CK (CPK) 上昇, 味覚異常, <u>筋肉痛</u> , <u>背部痛</u>	そ の 他	CK (CPK) 上昇, 味覚異常
注) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。		注) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。	

\*改訂内容につきましては DSU No.222 に掲載の予定です。

<改訂理由>

- ・ファモチジン製剤（経口剤）と関連性が否定できない副作用症例が集積されたことから、「副作用」の「その他の副作用」の項に「乳汁漏出症，筋肉痛，背部痛」を追記いたしました。

なお、改訂後の添付文書は日医工ホームページ

[http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine\\_m\\_seihin.html](http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine_m_seihin.html)

及び医薬品医療機器情報提供ホームページ <http://www.info.pmda.go.jp/> に掲載いたします。

