

# イトラコナゾール錠「日医工」

## 爪白癬のパルス療法を受けられる方へ

### お飲みいただくお薬は

イトラコナゾール錠  
50mg「日医工」  
(1日8錠)


イトラコナゾール錠  
100mg「日医工」  
(1日4錠)

朝食直後  
4錠



夕食直後  
4錠

朝食直後  
2錠




夕食直後  
2錠

### お薬の飲み方

パルス療法は、1週間お薬を飲んだ後に、3週間お薬を休むことを3回繰り返します。

お薬を飲まない期間を含めると治療期間は約3カ月となります。お薬は1日2回食事のすぐ後に、水またはぬるま湯で飲んでください。

治療中、お体の具合が悪くなった場合には、自己判断せずにかかりつけの医師または薬剤師に相談してください。



パルス療法は、お薬を飲む期間と休む期間を守ることで十分な効果が得られますので、飲み方を守って治療しましょう。

# イトラコナゾール錠「日医工」お薬カレンダー

お薬を飲む日を  
忘れないように  
チェックしましょう。

記入例

日付 6 / 1 6 / 2

☀️ 朝

🌙 夕

治療開始

日付 / / / / / / /

☀️ 朝

🌙 夕

3週間お薬を休む

2ヵ月目

日付 / / / / / / /

☀️ 朝

🌙 夕

3週間お薬を休む

3ヵ月目

日付 / / / / / / /

☀️ 朝

🌙 夕

3週間お薬を休む

爪の状態チェック