

# リトドリン塩酸塩錠 5mg「日医工」 を服用される方へ

このお薬は  
切迫流産や早産を起こさないようにするお薬です。



オモテ



ウラ

## ▶ 飲み方について

1. 主治医または薬剤師の指示通りに服用してください。
2. 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。




## ▶ 服用中の注意点

- このお薬が処方されている間は、安静にすることが大切です。お薬を服用した後、30分くらいは横になって休むようにしてください。
- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。




## ▶ 副作用について

- このお薬の服用で心臓がドキドキする、脈が速くなったように感じる、顔が赤くなる、手がふるえることがあります。**症状が強い場合は、主治医または薬剤師に相談してください。**




心臓が  
ドキドキする



脈が速くなった  
ように感じる



顔が赤くなる



手がふるえる

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**主治医または薬剤師に気軽に相談してください。**

## ▶ 保管等に関する注意点

- 光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。



日医工株式会社

NICHI-IKO