

# クロチアゼパム錠「日医工」

## を服用される方へ

このお薬は不安や緊張をやわらげる作用があります。通常、心身症（消化器疾患、循環器疾患）における不安・緊張・抑うつ・睡眠障害などの改善、自律神経失調症におけるめまい・肩こり・食欲不振の改善に用いられます。尚、漫然と長期に服用を続けると、お薬がないといられなくなったり、お薬を中止すると手足がふるえて不眠・不安・けいれんなどが起きたりすることがあります。必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。

### ▶ 服用する前に

次の方は医師または薬剤師にご相談ください。

緑内障の方、重症筋無力症の方、心臓・肝臓・腎臓・脳・肺に病気のある方、妊娠または妊娠している可能性のある方、授乳中の方。

### ▶ 服用に関する注意点

- 眠気が起こったり、注意や集中することができなくなったりすることがあるので、自動車の運転や高所での作業など危険を伴う機械の操作をしないでください。
- このお薬を服用している間は、アルコール類を飲まないでください。
- 自己判断で服用を中止したり、お薬の量を増やしたりしないでください。必ず医師に相談してください。
- 誤って多くを服用した場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- このお薬には一緒に服用する時に注意すべきお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。



### ▶ 副作用に関する注意点

このお薬の服用中に次の症状に気づいた場合には、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

身体がだるい、皮膚や白目が黄色くなる、食欲不振、吐き気

これらの症状以外でも気になることがあれば医師または薬剤師にご相談ください。

吐き気



### ▶ 保管等に関する注意点

- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人（親、兄弟、姉妹、友人など）に絶対に渡さないでください。
- 直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。