

# アリピプラゾールOD錠/錠/散「日医工」 を服用される方とご家族の方へ

アリピプラゾールOD錠/錠/散「日医工」を服用する際は以下のような副作用があらわれることがあります。このような症状が認められた場合には、主治医の先生にご相談ください。

## 1. 高血糖や低血糖があらわれることがあります

高血糖の症状（激しいのどの渇き、水やジュースをたくさん飲む、尿の量が多い、尿の回数が多いなど）や低血糖の症状（脱力感、倦怠感、冷や汗、手足のふるえ、うとうとする、意識が薄れるなど）があらわれたら、ただちに受診してください。



## 2. 衝動が抑えられない状態があらわれることがあります

社会的に不利な結果を招くにもかかわらず、ギャンブルや過剰で無計画な買い物を繰り返したり、性欲や食欲が病的に亢進するなど、衝動が抑えられない状態があらわれることがあります。このような症状があらわれたら、主治医に相談してください。



## 服用される前の注意点

- 次の方は主治医または薬剤師にご相談ください。
  - ・以前にお薬を服用して、かゆみや発疹などのアレルギー症状がでたことのある方
  - ・肝臓や心臓、血管に病気のある方、低血圧の方
  - ・てんかんなどけいれんを起こす病気のある方、または今までに起こしたことのある方
  - ・糖尿病の方、または糖尿病になったことのある方、もしくは血縁に糖尿病の人がいる方
  - ・むせたり、咳き込んだり、ものが飲み込みにくいことがある方
  - ・妊娠または妊娠している可能性のある方、授乳中の方
  - ・死にたいと強く思ったり考えたことがある方
  - ・他のお薬を服用中の方
- このお薬には併用を注意すべきお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。



## 服用中の注意点

- 眠気や注意力の低下などが起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
- 興奮しやすい、敵意をもつなど精神症状の悪化がみられたら、主治医または薬剤師に相談してください。
- 体重の変動があった場合には、他の病気を合併している可能性もありますので、主治医に相談してください。
- 月経が再開する、月経量が増える、貧血、子宮内膜症があらわれた場合には、主治医に相談してください。

上記以外にもお薬の服用中に気になることがあれば、主治医または薬剤師に相談してください。

## 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避けて保管してください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人（親、兄弟、姉妹、友人など）に絶対に渡さないでください。
- お薬が余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。