

アリピプラゾールOD錠/錠「日医工」 を服用される方とご家族の方へ

このお薬は、脳内の神経伝達物質のバランスを整えます。

服用する前に必ずお読みください

このお薬の服用中に、**血糖値が著しく上昇したり、低下したりすることがあります。**次のような症状に気づいたら、**お薬の服用をやめてただちに受診してください。**



● のどが渇く



● 水を多く飲む



● おしっこの回数が多い



● おしっこの量が多い



● 体がだるい



● 冷や汗がでる



● 手足のふるえ



● 意識の低下

衝動がおさえられない症状があらわれることがあります。
次のような症状に気づいたら、**主治医にご相談ください。**



● ギャンブルを繰り返す



● 病的な性欲亢進



● 過剰で無計画な買い物



● 暴食

飲み方について

- 主治医または薬剤師の指示通りに服用してください。自己判断でお薬の服用を中止したり、お薬の量を増やしたりしないでください。

服用中の注意点

- このお薬を服用すると、**眠気や注意力・集中力・反射能力などの低下がおこることがあります。**
自動車の運転など危険を伴う機械の操作はおこなわないでください。



- **アルコール飲料は控えてください。**
このお薬に影響します。



- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**

副作用について

次の症状に気づいたら、主治医または薬剤師に連絡してください。

- 体重の変動（増加・減少） ● むせる、咳き込む、ものが飲み込みにくい ● 不安、あせり・いらいら、興奮 ● 月経が再開する、月経量が増える、貧血、子宮内膜症

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**主治医または薬剤師に気軽に相談してください。**

保管等に関する注意点

- 直射日光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。

 **日医工株式会社**
NICH-IKO

2024年11月作成 N202400153

アリピプラゾールOD錠/錠「日医工」 を服用される方とご家族の方へ

このお薬は、脳内の神経伝達物質のバランスを整えます。

服用する前に必ずお読みください

このお薬の服用中に、**血糖値が著しく上昇したり、低下したりすることがあります。**次のような症状に気づいたら、**お薬の服用をやめてただちに受診してください。**



● のどが渇く



● 水を多く飲む



● おしっこの回数が多い



● おしっこの量が多い



● 体がだるい



● 冷や汗がでる



● 手足のふるえ



● 意識の低下

衝動がおさえられない症状があらわれることがあります。
次のような症状に気づいたら、**主治医にご相談ください。**



● ギャンブルを繰り返す



● 病的な性欲亢進



● 過剰で無計画な買い物



● 暴食

飲み方について

- 主治医または薬剤師の指示通りに服用してください。自己判断でお薬の服用を中止したり、お薬の量を増やしたりしないでください。

服用中の注意点

- このお薬を服用すると、**眠気や注意力・集中力・反射能力などの低下がおこることがあります。**
自動車の運転など危険を伴う機械の操作はおこなわないでください。



- **アルコール飲料は控えてください。**
このお薬に影響します。



- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**

副作用について

次の症状に気づいたら、主治医または薬剤師に連絡してください。

- 体重の変動（増加・減少） ● むせる、咳き込む、ものが飲み込みにくい ● 不安、あせり・いらいら、興奮 ● 月経が再開する、月経量が増える、貧血、子宮内膜症

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**主治医または薬剤師に気軽に相談してください。**

保管等に関する注意点

- 直射日光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。

 **日医工株式会社**
NICH-IKO