トラネキサム酸錠250mg「日医工」を服用される方へ

　この錠剤をシートから取り出す際、強く押し出すと割れることがあります。
　シートから取り出すときは、次のようにお取扱いください。

●押し出すときは両手で押し出さないでください。イラストの通り、片方の指で押し出してください。

●爪を立てず、指の腹で押し出してください。



日医工株式会社

2019年11月作成　N201900524

トラネキサム酸錠250mg「日医工」を服用される方へ

　この錠剤をシートから取り出す際、強く押し出すと割れることがあります。
　シートから取り出すときは、次のようにお取扱いください。

●押し出すときは両手で押し出さないでください。イラストの通り、片方の指で押し出してください。

●爪を立てず、指の腹で押し出してください。



日医工株式会社

2019年11月作成　N201900524

トラネキサム酸錠250mg「日医工」を服用される方へ

　この錠剤をシートから取り出す際、強く押し出すと割れることがあります。
　シートから取り出すときは、次のようにお取扱いください。

●押し出すときは両手で押し出さないでください。イラストの通り、片方の指で押し出してください。

●爪を立てず、指の腹で押し出してください。



日医工株式会社

2019年11月作成　N201900524

トラネキサム酸錠250mg「日医工」を服用される方へ

　この錠剤をシートから取り出す際、強く押し出すと割れることがあります。
　シートから取り出すときは、次のようにお取扱いください。

●押し出すときは両手で押し出さないでください。イラストの通り、片方の指で押し出してください。

●爪を立てず、指の腹で押し出してください。



日医工株式会社

2019年11月作成　N201900524

トラネキサム酸錠250mg「日医工」を服用される方へ

　この錠剤をシートから取り出す際、強く押し出すと割れることがあります。
　シートから取り出すときは、次のようにお取扱いください。

●押し出すときは両手で押し出さないでください。イラストの通り、片方の指で押し出してください。

●爪を立てず、指の腹で押し出してください。



日医工株式会社

2019年11月作成　N201900524

トラネキサム酸錠250mg「日医工」を服用される方へ

　この錠剤をシートから取り出す際、強く押し出すと割れることがあります。
　シートから取り出すときは、次のようにお取扱いください。

●押し出すときは両手で押し出さないでください。イラストの通り、片方の指で押し出してください。

●爪を立てず、指の腹で押し出してください。



日医工株式会社

2019年11月作成　N201900524

トラネキサム酸錠250mg「日医工」を服用される方へ

　この錠剤をシートから取り出す際、強く押し出すと割れることがあります。
　シートから取り出すときは、次のようにお取扱いください。

●押し出すときは両手で押し出さないでください。イラストの通り、片方の指で押し出してください。

●爪を立てず、指の腹で押し出してください。



日医工株式会社

2019年11月作成　N201900524

トラネキサム酸錠250mg「日医工」を服用される方へ

　この錠剤をシートから取り出す際、強く押し出すと割れることがあります。
　シートから取り出すときは、次のようにお取扱いください。

●押し出すときは両手で押し出さないでください。イラストの通り、片方の指で押し出してください。

●爪を立てず、指の腹で押し出してください。



日医工株式会社

2019年11月作成　N201900524