

使用上の注意改訂のお知らせ

利尿降圧剤

日本薬局方 フロセミド注射液

フロセミド注射液 20mg「日医工」

製造販売元 日医工株式会社

富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容>（ ：自主改訂）

改訂後		現行	
4. 副作用 (2) その他の副作用		4. 副作用 (2) その他の副作用	
	頻度不明		頻度不明
	(現行どおり)		(略)
皮膚^{注1)}	発疹、蕁麻疹、発赤、光線過敏症、そう痒症、水疱性皮膚炎、紫斑、 <u>苔癬様皮疹</u>	皮膚^{注1)}	発疹、蕁麻疹、発赤、光線過敏症、そう痒症、水疱性皮膚炎、紫斑
	(現行どおり)		(略)
注1) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。		注1) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。	

*改訂内容につきましては DSU No.266 に掲載の予定です。

<改訂理由>

- フロセミド製剤との因果関係が否定できない「苔癬様皮疹」の症例が集積されたことから、「その他の副作用」の項に追記することといたしました。

なお、改訂後の添付文書は日医工株式会社ホームページ

http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine_m_seihin.html

及び医薬品医療機器総合機構ホームページ <http://www.pmda.go.jp/> に掲載いたします。

