

## 服用時の注意点

- この薬は、他に処方されたお薬がある場合はそのお薬を飲んで30分～1時間経過してから服用してください。  
他のお薬と一緒に飲まないようにしてください。

※同時に服用すると、他のお薬の効果を弱めてしまうおそれがあります。



同時に飲まない

### 開封の仕方

- 切り口を上にして、キリトリ線に沿って開封してください。
- アルミ袋がしづんでいる場合、開封前に手であたためてください。  
(詳細はうら面をご覧ください)
- 切り口付近にお薬がある場合、開封時にお薬が飛び散ることがあります。



### 服用の仕方

- 最初に一口水をふくんでから、お薬を口の中に入れ、一気に飲み込むようにしてください。
- 服用する際は、お薬が気管に入らないようにご注意ください。
- 入れ歯や歯を治療中の人は、お薬が歯の隙間に入らないようにしてください。



- 便秘、はきけ、腹痛や発しん、かゆみなどの症状があらわれた場合は、早めに主治医または薬剤師にご相談ください。

うら面も必ずお読みください。

## 取扱い・保管の注意

このお薬は小さく硬い黒色の細粒です。

下記の点にご注意ください。

### 温度が上がると…

- アルミ袋は30°Cを超えると、膨らむことがあります。中身のお薬に影響はありません。30°C以下になれば元どおりになります。

### 温度が下がると…

- 温度の低いところでは、アルミ袋がしほむことがあります。アルミ袋を手のひらで1~2分軽く握ると通常の状態に戻ります。

このお薬は、肉眼では見えませんが粒の中に無数の細かな穴が空いています。この穴の中に周りの温度の変化により、空気が出たり入ったりします。アルミ袋が膨らんだりしほんだりするのは、お薬に化学的な変化が起きているものではなく、アルミ袋が破裂する心配もありません。

球形吸着炭

30°Cを超えると…

球形吸着炭

室温で保存してください



### 取扱方法

- 机の上や床などにこぼれた際に、こすれて傷つけたりするおそれがありますので、濡れタオル等で拭き取るか掃除機で吸い取ってください。

病・医院・薬局名

