

# 日医工のバルプロ酸 ナトリウム細粒・シロップ を服用される方とご家族の方へ

このお薬はてんかんや躁<sup>そうじょうたい</sup>状態の治療に用いられます。  
また、片頭痛発作の発症抑制にも用いられます。

## 服用する前に必ずお読みください

○このお薬には催<sup>さい</sup>奇形性<sup>きけいせい</sup>(胎児に奇形が生じる可能性)がある<sup>ある</sup>ので、妊娠または妊娠している可能性のある方、妊娠する可能性のある方は、必ず主治医に相談してください。

## ▶ 飲み方について

1. 必ず主治医または薬剤師の指示通りに服用してください。自己判断で服用を中止したり、お薬の量を減らしたり増やしたりしないでください。



【片頭痛発作の発症抑制で服用される方へ】


このお薬はすでに起こっている片頭痛の発作や症状を速やかに鎮めるお薬ではありません。毎日規則正しく服用することで発作の発症を抑制するお薬です。

## ▶ 飲み方について


2. 飲み忘れに気づいても、決して**2回分を一度に服用しないでください**。
3. 誤って多く服用した場合は、主治医または薬剤師に連絡してください。

### 4. シロップの飲み方


1包(4ml)を切り離し、容器を立てた状態で矢印の方向にゆっくりと回し、開けてください。



胴体部分を持って  
ねじるように切り離します



立てたまま、ゆっくり  
回して開封します




軽く押しながら  
服用してください


**開封後は速やかに服用し、残ったお薬は廃棄してください。**

## ▶ 服用中の注意点

- 眠気、注意力・集中力・反射能力などが低下することがあるので、**自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。**



- 授乳は避けてください。
- このお薬には一緒に服用してはいけないお薬や注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**



## ▶ 副作用について

- このお薬の服用でウトウトする、頭痛、気持ちが悪い、オシッコが近い、体がだるいなどの症状があらわれることがあります。症状が強い場合は、主治医または薬剤師に相談してください。



頭痛



気持ちが悪い



体がだるい

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

## ▶ 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- **細粒は、湿気によりお薬の一部が固まった状態になることがあります。効果が問題はありません。**
- シロップは、誤用を避けるため、**他の容器に移しかえて保存しないでください。**
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。

