

## 使用上の注意改訂のお知らせ

カルシウム補給剤  
日本薬局方 グルコン酸カルシウム水和物

# カルチコール末

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社  
富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

### <改訂内容> ( ..... : 自主改訂)

改 訂 後			現 行		
3. 相互作用 (2) 併用注意（併用に注意すること）			3. 相互作用 (2) 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等 (略)	臨床症状・措置方法 (略)	機序・危険因子 (略)	薬剤名等 (略)	臨床症状・措置方法 (略)	機序・危険因子 (略)
テトラサイクリン系 抗生物質 ミノサイクリン、 ドキシサイクリン、 テトラサイクリン等 ニューキノロン系抗 菌剤 シプロフロキサシン、 ノルフロキサシン、 トスフロキサシン <u>ビスホスホネート系薬 剤（経口剤）</u> エチドロン酸二ナ トリウム等	これらの薬剤の 効果が減弱する おそれがあるの で、投与間隔を できるだけあけ るなど注意する こと。	カルシウム がこれらの 薬剤と難溶 性のキレー トを形成 し、これら の薬剤の吸 収を阻害す ると考えら れる。	テトラサイクリン系 抗生物質 ミノサイクリン、 ドキシサイクリン、 テトラサイクリン等 ニューキノロン系抗 菌剤 シプロフロキサシン、 ノルフロキサシン、 トスフロキサシン エチドロン酸二ナト リウム	これらの薬剤の 効果が減弱する おそれがあるの で、投与間隔を できるだけあけ るなど注意する こと。	カルシウム がこれらの 薬剤と難溶 性のキレー トを形成 し、これら の薬剤の吸 収を阻害す ると考えら れる。
(略)			(略)		

\*改訂内容につきましては DSU No.235 に掲載の予定です。

### <改訂理由>

- 「相互作用」の「併用注意」の項に従来より、「エチドロン酸二ナトリウム」を記載しておりますが、他の経口ビスホスホネート系薬剤の「使用上の注意」においてもカルシウムを含む薬剤が「併用注意」とされていることから、記載整備いたしました。

なお、改訂後の添付文書は日医工株式会社ホームページ

[http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine\\_m\\_seihin.html](http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine_m_seihin.html)

及び医薬品医療機器情報提供ホームページ <http://www.info.pmda.go.jp/> に掲載いたします。

