

**「使用上の注意」改訂のお知らせ**

副腎皮質ホルモン製剤

処方箋医薬品<sup>注)</sup>

デキサメタゾン エリキシル

**デカドロンエリキシル 0.01%**

製造販売元 **日医工株式会社**  
富山市総曲輪1丁目6番21

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

この度、上記製品において、「使用上の注意」の一部を改訂（下線部）しましたので、お知らせ申し上げます。今後の弊社製品のご使用に際しましては、下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容> ( \_\_\_\_\_ : 自主改訂)

改訂後		改訂前	
11. 副作用		11. 副作用	
11.2 その他の副作用		11.2 その他の副作用	
	頻度不明		頻度不明
内分泌	月経異常	内分泌	月経異常
消化器	下痢、悪心・嘔吐、胃痛、胸やけ、腹部膨満感、口渇、食欲不振、 <u>食欲亢進、便秘</u>	消化器	下痢、悪心・嘔吐、胃痛、胸やけ、腹部膨満感、口渇、食欲不振、 <u>食欲亢進</u>
精神神経系	多幸症、不眠、頭痛、めまい、 <u>振戦、末梢性感覚ニューロパチー、<u>激越、傾眠</u></u>	精神神経系	多幸症、不眠、頭痛、めまい
筋・骨格	筋肉痛、 <u>関節痛、<u>関節腫脹</u></u>	筋・骨格	筋肉痛、 <u>関節痛</u>
脂質・蛋白質代謝	満月様顔貌、野牛肩、窒素負平衡、脂肪肝	脂質・蛋白質代謝	満月様顔貌、野牛肩、窒素負平衡、脂肪肝
体液・電解質	浮腫、血圧上昇、 <u>低カリウム性アルカローシス、<u>低ナトリウム血症、<u>高カリウム血症</u></u></u>	体液・電解質	浮腫、血圧上昇、 <u>低カリウム性アルカローシス</u>
眼	中心性漿液性網脈絡膜症等による網膜障害、 <u>眼球突出</u>	眼	中心性漿液性網脈絡膜症等による網膜障害、 <u>眼球突出</u>
血液	<u>白血球増多、<u>好中球減少症、<u>血小板減少症、<u>白血球減少症</u></u></u></u>	血液	白血球増多
皮膚	ざ瘡、多毛、脱毛、色素沈着、皮下いっ血、紫斑、 <u>線条、<u>そう痒、<u>発汗異常、<u>顔面紅斑、<u>紅斑、<u>創傷治癒障害、<u>皮膚菲薄化・脆弱化、<u>脂肪織炎、<u>皮膚乾燥</u></u></u></u></u></u></u></u></u>	皮膚	ざ瘡、多毛、脱毛、色素沈着、皮下いっ血、紫斑、 <u>線条、<u>そう痒、<u>発汗異常、<u>顔面紅斑、<u>紅斑、<u>創傷治癒障害、<u>皮膚菲薄化・脆弱化、<u>脂肪織炎</u></u></u></u></u></u></u></u>
過敏症	発疹	過敏症	発疹
その他	発熱、疲労感、ステロイド腎症、 <u>頻尿、<u>体重増加、<u>精子数及びその運動性の増減、<u>しゃっくり、<u>発声障害、<u>咳嗽、<u>動悸、<u>耳鳴</u></u></u></u></u></u></u></u>	その他	発熱、疲労感、ステロイド腎症、 <u>体重増加、<u>精子数及びその運動性の増減、<u>しゃっくり</u></u></u>

<改訂理由>

- ・同一成分薬における症例集積に基づき、「その他の副作用」の項を改訂しました。

<変更ロット・流通予定時期>

変更ロット・流通予定時期については、現段階では未定です。当面の間、新・旧が混在し、ご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

## <GS1 バーコード>

最新の注意事項等情報につきましては、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」で下記 GS1 バーコードを読み取ることで、スマートフォンやタブレット端末でご覧いただけます。

なお、「添文ナビ」アプリにつきましては、ご使用になれる端末に合わせて「App Store」または「Google Play」よりダウンロードしてください。

## デカドロンエリキシル



(01)14987376553619

今回の【使用上の注意】の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報 No.303」(2021年11月発行)に掲載の予定です。

また、改訂後の電子化された添付文書は医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/>) ならびに弊社ホームページ「医療関係者の皆さまへ」(<https://www.nichiiko.co.jp/medicine/>)に掲載致します。

デカドロンエリキシル 21-020A