

シロスタゾール内服ゼリー「EE」 を服用される方へ

このお薬は、血液が固まるのを防ぎ、血管を拡張、血液の流れをよくして、足の痛みや冷え等の症状を改善する働きがあります。

また、脳梗塞の症状が落ち着いたあとの再発を抑える働きがあります。



シロスタゾール内服ゼリー50mg「EE」



シロスタゾール内服ゼリー100mg「EE」

▶ 服用前の注意点


次の方はお薬を服用する前に医師または薬剤師に相談してください。

- 以前にお薬を服用して、かゆみや発疹等のアレルギー症状がでたことのある方
- 出血している方、出血しやすい方、月経期間中の方
- 心臓に病気のある方 ● 肝臓に病気のある方 ● 腎臓に病気のある方
- 糖尿病または糖尿病の疑いのある方 ● 持続して血圧が上昇している高血圧の方
- 妊娠または妊娠している可能性がある方、授乳中の方
- 手術や抜歯を予定している方 ● 他にお薬を服用中の方


▶ 服用時の注意点

- 服用するお薬の量は、あなたの症状などにあわせて医師が決めます。必ず医師の指示通りに服用してください。自分の判断で服用を止めたり、お薬の量を増やしたり減らしたりしないでください。
- 飲み忘れた場合は気がついた時に1回分を服用してください。ただし、次に服用する時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分を服用してください。絶対に2回分を一度に服用しないでください。
- グレープフルーツジュースと一緒に飲まないでください。同時に飲むとお薬の作用が強くなる恐れがあります。


▶ お薬の飲み方



ゼリー部分を上にし
切り口の下を持ちます



切り口のところから
完全に切り取ります



空気部分を指で矢印の方向
にゆっくり押し、中のゼリー
を出して服用します

- 開封後はすみやかに服用し、残った分は捨ててください。
- 分包のまま服用しないでください。

▶ 服用中の注意点

- このお薬を服用すると、一時的に頭痛や動悸があらわれることがあります。もし、これらの症状が続く場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- 手術や内視鏡検査、歯の治療などを受ける場合、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。
- このお薬には併用に注意すべきお薬があります。他の病院を受診される場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

▶ 副作用の注意点

このお薬を服用中に次のような症状に気づいたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

突然の頭痛
めまい・発熱



吐き気・嘔吐
食欲不振



息苦しい
疲れやすい



急激な胸の
圧迫感
激しい動悸



鼻血が出やすい
あざがでやすい



これら以外にも気になる症状が起こった場合は、医師または薬剤師に相談してください。

▶ 保管等に関する注意点

- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人（親、兄弟、姉妹、友人など）に絶対に渡さないでください。
- 直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 誤用を避けるため、他の容器に移し替えて保存しないでください。
- 上に重いものをのせないでください。
- 携帯する時は、折り曲げないように注意してください。