

使用上の注意改訂のお知らせ

処方箋医薬品  
利尿降圧剤

日本薬局方 フロセミド錠  
ラシックス®錠 10mg  
ラシックス®錠 20mg  
ラシックス®錠 40mg

処方箋医薬品  
利尿降圧剤

日本薬局方 フロセミド注射液  
ラシックス®注 20mg

処方箋医薬品

降圧剤（持効性フロセミド）

オイテンシン®カプセル 40mg

フロセミド製剤

処方箋医薬品  
利尿降圧剤

ラシックス®細粒 4%

フロセミド製剤

処方箋医薬品  
利尿剤

日本薬局方 フロセミド注射液  
ラシックス®注 100mg

製造販売元：  
サノフィ株式会社  
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

販売提携：  
日医工サノフィ株式会社  
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

販売元：  
日医工株式会社  
富山市総曲輪1丁目6番21

この度上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容>（-----：自主改訂）

改 訂 後			現 行		
3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）			3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
（現行どおり）			（略）		
糖尿病用剤 スルホニルウ レア剤 インスリン	（現行どおり）	（現行どおり）	糖尿病用剤 スルホニルウ レア剤 インスリン	（略）	（略）
<u>SGLT2 阻害剤</u>	<u>利尿作用が増強されるおそれがあるので、 血圧、脈拍数、尿量、血清ナトリウム濃度等を確認し、 脱水症状の発現に注意すること。必要 に応じ本剤の用量を調整するなど注意 すること。</u>	<u>利尿作用が増強されるおそれがある。</u>	記載なし		
リチウム 炭酸リチウム	（現行どおり）	（現行どおり）	リチウム 炭酸リチウム	（略）	（略）
（現行どおり）			（略）		

\* 改訂内容につきましては DSU No.234 に掲載の予定です。

<改訂理由>

・「相互作用（併用注意）」の項（自主改訂）

「SGLT2 阻害剤」を追記

SGLT2 阻害剤の「相互作用（併用注意）」の項に「利尿作用を有する薬剤（ループ利尿剤、チアジド系利尿剤 等）」が記載されたことを受け、本剤においても同様の注意喚起を行うことと致しました。

改訂後の添付文書につきましては、医薬品医療機器総合機構「医薬品医療機器情報提供ホームページ」  
<http://www.info.pmda.go.jp/>

又は、日医工株式会社ホームページ

[http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine\\_m\\_seihin.html](http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine_m_seihin.html)

に添付文書情報が掲載されていますので、併せてご参照下さい。