

イソソルビド内服ゼリー 70%「日医工」 を服用される方へ

このお薬は、体の中の余分な水分を
体外に排出するお薬です。



イソソルビド内服ゼリー
70%分包20g「日医工」



イソソルビド内服ゼリー
70%分包30g「日医工」

● 服用前の注意点

次の方は、医師または薬剤師に相談してください。

- 以前にお薬を服用してかゆみや発疹などのアレルギー症状がでたことのある方
- 頭部外傷により頭痛や嘔吐などの症状のある方
- 脱水状態の方
- 尿閉のある方や腎臓に障害のある方
- うつ血性心不全のある方
- 妊娠または妊娠している可能性のある方

● カップの開け方と服用方法

お薬が2~3個連なった形で処方されたときは、ミシン目を上下に2~3度折り曲げて、ねじるように切り離してください。


*イラストは30g製剤ですが、20g製剤も同じ方法で服用してください。

1



ふた(シール)に「あけ口」と印刷されているところが、はがし口です。

2




はがし口の下のツメを押さえて、シールの先をつまんでください。

3



ツメを押さえたまま、シールを引きはがしてください。

4



カップ内のゼリーをスプーンでくって服用してください。

*このお薬には、スプーンは添付されていません。ご家庭のスプーンをお使いください。

服用時の注意点

- 必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。自己判断で服用を中止したり、お薬の量を増やしたり減らしたりしないでください。
- 飲み忘れに気付いた時は、1回分ができるだけ早く服用してください。ただし、次の服用時間が近い場合は1回とばして次の時間に1回分を服用してください。決して一度に2回分を服用しないでください。
- 誤って多く服用した場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- 服用する時は、のどに詰まらせたり肺・気管に薬が入ったりしないよう、少量ずつスプーンにとりながら服用してください。また、必要に応じて、少量の水等とともに服用してください。
- フタを開ける際、カップをなるべく水平に持ってフタを開けてください。カップをかたむけると、中の水分がこぼれ出る場合があります。
- 天然物である寒天を使用しているため、ゼリーの固さが変わることがあります。また、ゼリーの表面に凸凹や気泡があつたり、水分が浮いていることがあります、品質に問題はありません。
かんてん
- 開封後はすぐに服用し、残した場合は保管せず、廃棄してください。

服用しやすくするための工夫

お薬に下記のような市販の食品を混ぜて服用していただくことも可能です。ただし、混ぜたものはすぐに服用し、そのまま保管しないでください。(当社試験結果より)

- コーヒーフレッシュ
- ヨーグルト
- ココアパウダー

- アイスクリーム
- ママレードジャム



●●副作用の注意点

以下のような症状があらわれた場合には早めに医師または薬剤師に相談してください。



発疹



呼吸困難



血圧低下



動悸



恶心



嘔吐



下痢



頭痛

これら以外にも気になる症状があらわれた場合には医師または薬剤師に相談してください。

●●保管等に関する注意点

- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光を避け、室温で保管してください。冷蔵保存も可能です。ただし、冷凍保存はおやめください。
- 車の中など、高温下での保管はおやめください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人（親、兄弟、姉妹、友人など）に絶対に渡さないでください。